

Fiche CONSEIL

N°1

ENTRETIEN ÉVALUATION & OBSERVANCE MON TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)



1

JE PRENDS MON TRAITEMENT
CHAQUE JOUR À LA MÊME HEURE,
AU MILIEU DU REPAS

2

J'AI TOUJOURS SUR MOI MA CARTE

"je suis sous anticoagulants"

et j'en parle à chaque professionnel de santé que je vois.



3

JE SUIS VIGILANT AU QUOTIDIEN

- **Ne jamais prendre d'autres médicaments**, y compris les produits disponibles sans ordonnance (par exemple, des anti-inflammatoires) ou des compléments alimentaires (par exemple, du millepertuis) SANS en parler au préalable à mon médecin ou à mon pharmacien.
- **Ne pas pratiquer de sport violent** et éviter les **travaux** qui peuvent entraîner une coupure ou une chute.

ON PREND
SOIN
DE VOUS !

Que faire en cas d'oubli ?



NE JAMAIS DOUBLER LA DOSE
POUR COMPENSER UN OUBLI.

CES MÉDICAMENTS SONT TRÈS
SENSIBLES À L'OUBLI D'UNE
PRISE.

La dose oubliée peut être prise jusqu'à la moitié
de l'intervalle de temps avant la prise suivante.

SI 1 PRISE



Jusqu'à 12h après

SI 2 PRISES



Jusqu'à 6h après

NORMANDIE PHARMA



EFFETS DU TRAITEMENT MON TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)

JE CONNAIS LES SIGNES DE SUR ET SOUS-DOSAGE

ON PREND
SOIN
DE VOUS !

> Signes de surdosage : **RISQUE HÉMORRAGIQUE.**

Apparition d'un saignement, même s'il semble mineur :

- Saignement des gencives, du nez ou œil rouge (hémorragie conjonctivale),
- Présence de sang dans les urines, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires,
- Règles anormalement abondantes,
- Apparition de « bleus » (hématomes) sans cause évidente,
- Vomissements ou crachats sanglants,
- Saignement qui ne s'arrête pas.

Apparition de signes pouvant évoquer un saignement interne non visible :

- Fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, malaise inexpliqué.
- Pâleur inhabituelle,
- Mal de tête ne cédant pas au traitement.



EN CAS D'APPARITION
D'UN DE CES SYMPTÔMES,
CONTACTEZ LE 15

> Signes de sous-dosage : **RISQUE DE FORMATION DE CAILLOTS ET DONC DE SURVENUE D'AVC, DE PHLÉBITE OU D'EMBOLIE PULMONAIRE.**

- **Signes d'AVC** : troubles de la parole ou de la vision, déformation de la bouche, paralysie d'un côté du corps ou d'un membre, mal de tête violent et persistant.
- **Signes de thrombose veineuse** : œdème d'une cuisse, d'une jambe ou seulement d'un mollet, douleur unilatérale avec ou sans œdème.
- **Signes d'embolie pulmonaire** : essoufflement soudain, douleur thoracique, crachat sanglant.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Les anticoagulants oraux directs (AOD) présentent de nombreuses interactions médicamenteuses.
Pour votre sécurité, respectez ces consignes :

ZÉRO AUTOMÉDICATION :

Ne prenez **JAMAIS** de nouveau traitement (même pour une douleur banale ou un rhume) sans l'avis préalable de votre médecin ou de votre pharmacien.

VIGILANCE MÉDICALE :

Toute nouvelle infection ou douleur doit faire l'objet d'une consultation.



Fiche CONSEIL

N°3

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE & VIE QUOTIDIENNE MON TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)



JE SUIS VIGILANT AU QUOTIDIEN



- Surveiller sa fonction rénale et son hémoglobine au moins une fois par an (prise de sang).

- Soyez vigilants en cas de déshydratation (diarrhée, vomissements, chaleur importante, fièvre,...) et n'hésitez pas à contacter votre médecin.

LES POINTS DE VIGILANCE



> VOTRE POIDS : UN POINT CLÉ.

Votre poids influence l'efficacité et la sécurité de votre traitement.

Surveillance : Pesez-vous régulièrement.



Prévenez votre médecin en cas d'amaigrissement, surtout si vous pesez moins de 60 kg (ou 50 kg pour le Pradaxa/Dabigatran).



> INFORMER LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ

Signalez systématiquement que vous prenez un anticoagulant à tous les professionnels que vous consultez (dentiste, kiné, podologue, infirmier, etc.).



Votre carte de patient :
Gardez-la toujours sur vous (dans votre portefeuille)

**ELLE EST VITALE
EN CAS D'URGENCE.**



> ALIMENTATION ET COMPLÉMENTS

Repas : Aucun aliment n'est interdit.

Phytothérapie : Prudence avec les plantes et compléments alimentaires.

Le Millepertuis est notamment déconseillé.

Demandez toujours l'avis de votre pharmacien avant de prendre un produit «naturel».



ATTENTION :

SI VOUS PRENEZ DU RIVAROXABAN (15 MG OU 20 MG)

**VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT
LE PRENDRE PENDANT UN REPAS.**