

MON TRAITEMENT DE L'ASTHME COMPRENDRE MON TRAITEMENT



MON TRAITEMENT DE FOND :

- Traite l'inflammation des bronches sur le long terme
- À prendre chaque jour, même sans symptômes
- Efficace après 1 à 2 semaines de prise régulière
- Objectif : Empêcher les crises de survenir
- À ne jamais arrêter sans avis médical

ON PREND
SOIN
DE VOUS !



Scannez le QR-Code pour
regarder le tuto d'utilisation
de votre inhalateur !

MON TRAITEMENT DE CRISE :

- Ouvre les bronches immédiatement
- À prendre uniquement en cas de gêne, de toux ou parfois avant un effort
- À avoir toujours sur soi


L'asthme est bien contrôlé si vous n'avez presque plus besoin de votre traitement de crise.

SIGNAL D'ALERTE :



Si vous utilisez votre traitement de crise plus de 2 fois par semaine, l'inflammation n'est pas maîtrisée. Consultez votre médecin pour adapter votre traitement de fond.


MON TRAITEMENT DE L'ASTHME COMPRENDRE MON TRAITEMENT





MON TRAITEMENT DE L'ASTHME COMMENT UTILISER MON INHALATEUR ?

COMMENT UTILISER MON INHALATEUR ?



- Vider ses poumons avant de prendre la dose
- Préparer la dose si nécessaire
- Inspirer profondément (tout en déclenchant selon les modèles)
- Bloquer sa respiration 10 secondes pour laisser le produit se déposer



*Scannez le QR-Code pour regarder
le tuto d'utilisation de votre inhalateur !*

LE SAVIEZ-VOUS ?

Se rincer systématiquement la bouche après chaque utilisation d'un dispositif d'inhalation aide à éviter les effets secondaires (mycoses, voix rauque,...)



Fiche CONSEIL

N°3

MON TRAITEMENT DE L'ASTHME SURVEILLANCE ET VIE QUOTIDIENNE



QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?



En cas d'oubli, vous pouvez rattraper la prise dès que vous vous en apercevez, sauf si l'instant est proche de la prise suivante. En aucun cas il ne faut doubler la dose.

AUTOMEDICATION : VIGILANCE



Vos bronches sont sensibles, **n'utilisez pas certains produits sans l'accord de votre médecin ou de votre pharmacien** : aspirine et ibuprofène, certains sirops pour la toux et sédatifs, huiles essentielles et sprays d'intérieur.



DIFFICULTÉS À PARLER, SIFFLEMENT FORT, TRAITEMENT DE CRISE QUI N'AGIT PAS : CONTACTEZ LE 15

ATTENTION AUX FACTEURS DÉCLENCHANTS

- **TABAC** (même passif)
- **POLLENS ET ACARIENS** (aérer 10 min/jour, laver la literie 1 fois/semaine, éviter moquettes, tapis éviter de tondre au printemps,...)
- **POILS D'ANIMAUX** (aspirer très fréquemment)
- **POLLUTION** et pics de froid



*En savoir +
sur les facteurs
déclenchants*

LES VACCINATIONS RECOMMANDÉES

Les infections respiratoires sont les premières causes d'aggravation de l'asthme.

- Grippe saisonnière tous les ans.
- Pneumocoque : Pour prévenir certaines formes de pneumonies graves.
- Coqueluche et COVID-19 : Assurez-vous d'être à jour dans vos rappels pour limiter les risques de complications respiratoires.