

Fiche CONSEIL

N°3

MON TRAITEMENT PAR ANTI-VITAMINE K (AVK)



JE CONNAIS LES SIGNES DE SUR ET SOUS-DOSAGE

SIGNES DE SURDOSAGE (INR TROP ÉLEVÉ) : RISQUE HÉMORRAGIQUE.

Apparition d'un saignement, même s'il semble mineur :

- Saignement des gencives, du nez ou oeil rouge (hémorragie conjonctivale)
- Présence de sang dans les urines, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires
- Règles anormalement abondantes
- Apparition de « bleus » (hématomes) sans cause évidente
- Vomissements ou crachats sanglants
- Saignement qui ne s'arrête pas

Apparition de signes pouvant évoquer un saignement interne non visible :

- Fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, malaise inexplicable
- Pâleur inhabituelle
- Mal de tête ne cédant pas au traitement

SIGNES DE SOUS-DOSAGE (INR TROP BAS) : RISQUE DE FORMATION DE CAILLOTS ET DONC DE SURVENUE D'AVC, DE PHLÉBITE OU D'EMBOLE PULMONAIRE.

- **Signes d'AVC** : troubles de la parole ou de la vision, déformation de la bouche, paralysie d'un côté du corps ou d'un membre, mal de tête violent et persistant.
- **Signes de thrombose veineuse** : oedème d'une cuisse, d'une jambe ou seulement d'un mollet, douleur unilatérale avec ou sans oedème.
- **Signes d'embolie pulmonaire** : essoufflement soudain, douleur thoracique, crachat sanglant.



**SI VOTRE INR N'EST PAS DANS LA CIBLE OU EN CAS
D'APPARITION D'UN DE CES SYMPTÔMES,
CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 15**

• **AUTOMÉDICATION** : Ne prenez jamais d'aspirine, d'anti-inflammatoires ou de nouveaux médicaments (même naturels comme le millepertuis, compléments alimentaires) sans l'avis de votre médecin/pharmacien.

• **ALIMENTATION** : Ne changez pas brutalement vos habitudes. Certains aliments (choux, brocolis, épinards, salade,...) sont riches en vitamine K et peuvent modifier l'effet du traitement s'ils sont consommés en excès soudain.