

Fiche CONSEIL

N°1

MON TRAITEMENT PAR ANTI-VITAMINE K (AVK)



QUAND LE PRENDRE ?

Prise le soir à heure régulière.

ON PREND
SOIN
DE VOUS !



Ne modifiez jamais votre dose seul. Toute adaptation doit être validée par votre médecin.



J'AI TOUJOURS SUR MOI MA CARTE

"je suis sous anticoagulants"



PRÉVENTION :

Prévenez tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, dentiste, infirmier, kiné,...) que vous êtes sous AVK avant un soin.

NORMANDIE PHARMA

Fiche CONSEIL

N°2



MON TRAITEMENT PAR ANTI-VITAMINE K (AVK)

JE SUIS VIGILANT
AU QUOTIDIEN



- **L'EXAMEN CLÉ : LA PRISE DE SANG POUR CONNAÎTRE L'INR.**
C'est la mesure de votre taux de coagulation. Faites-le régulièrement (le matin, au moins 1 fois/mois, plus si prescrit par votre médecin) et notez le résultat dans votre carnet.

NOTEZ ICI VOTRE INR CIBLE :

ON PREND
SOIN
DE VOUS !

Que faire en cas d'oubli ?

Moins de 8h
de retard :



Prenez la dose
immédiatement.

Plus de 8h
de retard :



Sautez la prise et
reprenez la dose
habituelle le
lendemain soir.



IMPORTANT :

NE JAMAIS DOUBLER LA DOSE
POUR COMPENSER UN OUBLI.
NOTEZ L'OUBLI DANS VOTRE
CARNET DE SUIVI.

NORMANDIE PHARMA

Fiche CONSEIL

N°3

MON TRAITEMENT PAR ANTI-VITAMINE K (AVK)



JE CONNAIS LES SIGNES DE SUR ET SOUS-DOSAGE

SIGNES DE SURDOSAGE (INR TROP ÉLEVÉ) : RISQUE HÉMORRAGIQUE.

Apparition d'un saignement, même s'il semble mineur :

- Saignement des gencives, du nez ou oeil rouge (hémorragie conjonctivale)
- Présence de sang dans les urines, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires
- Règles anormalement abondantes
- Apparition de « bleus » (hématomes) sans cause évidente
- Vomissements ou crachats sanglants
- Saignement qui ne s'arrête pas

Apparition de signes pouvant évoquer un saignement interne non visible :

- Fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, malaise inexplicable
- Pâleur inhabituelle
- Mal de tête ne cédant pas au traitement

SIGNES DE SOUS-DOSAGE (INR TROP BAS) :

RISQUE DE FORMATION DE CAILLOTS ET DONC DE SURVENUE D'AVC, DE PHLÉBITE OU D'EMBOLE PULMONAIRE.

- **Signes d'AVC** : troubles de la parole ou de la vision, déformation de la bouche, paralysie d'un côté du corps ou d'un membre, mal de tête violent et persistant.
- **Signes de thrombose veineuse** : oedème d'une cuisse, d'une jambe ou seulement d'un mollet, douleur unilatérale avec ou sans oedème.
- **Signes d'embolie pulmonaire** : essoufflement soudain, douleur thoracique, crachat sanglant.



**SI VOTRE INR N'EST PAS DANS LA CIBLE OU EN CAS
D'APPARITION D'UN DE CES SYMPTÔMES,
CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 15**

• **AUTOMÉDICATION** : Ne prenez jamais d'aspirine, d'anti-inflammatoires ou de nouveaux médicaments (même naturels comme le millepertuis, compléments alimentaires) sans l'avis de votre médecin/pharmacien.

• **ALIMENTATION** : Ne changez pas brutalement vos habitudes. Certains aliments (choux, brocolis, épinards, salade,...) sont riches en vitamine K et peuvent modifier l'effet du traitement s'ils sont consommés en excès soudain.