

# Le guide de la contraception d'urgence



## Fiche de dispensation

Dirigez vers l'espace de confidentialité, mettre en confiance sans porter de jugement

**Questionner** pour cerner le contexte et juger de l'opportunité de la prise d'une contraception d'urgence.

| Molécule                                           | Lévonorgestrel 1,5 mg<br>Norlevo                                                                                           | Ulipristal 30 mg<br>EllaOne                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalités de prise</b>                          | 1 cp à prendre le plus tôt possible, au plus tard dans les <b>72h après</b> le rapport sexuel                              | 1 cp à prendre le plus tôt possible, au plus tard dans les <b>120h après</b> le rapport sexuel                                                             |
| <b>Effets indésirables<br/>Informé et rassurer</b> | Saignements vaginaux, tension mammaire, fatigue, céphalées, vertiges, nausées, douleurs abdominales, épisodes diarrhéiques | Saignements vaginaux, tension mammaire, fatigue, céphalées, vertiges, nausées, douleurs abdominales, épisodes diarrhéiques, troubles de l'humeur, myalgies |
| <b>Lutter contre les idées reçues</b>              | Son utilisation n'entraîne pas de stérilité                                                                                | Son utilisation n'entraîne pas de stérilité                                                                                                                |

### Conseiller et rappeler quelques messages-clés

#### Il y a toujours un risque de grossesse après un rapport sexuel non protégé

Surveiller l'apparition des prochaines règles (en cas de retard de plus de 5 à 7 j : test de grossesse)

#### Protéger les rapports sexuels à venir

Rappeler que les préservatifs sont gratuits jusqu'à 26 ans

#### La CUH est une méthode occasionnelle

Mettre en place une contraception régulière, orienter vers le MG ou la sage-femme,

#### Aborder les IST

Rappeler que le préservatif est la seule méthode efficace de protection et orienter vers un centre de dépistage gratuit

<https://www.corevih-normandie.fr/patients-usagers/depistage/les-cegid-d-en-normandie/les-cegid-d-en-normandie.6654.14331.html>

#### Fournir le flyer Cespharm

<https://www.cespharm.fr/prevention-sante/catalogue/La-contraception-d-urgence-depliant-2023>

### Facturer

|                     | Mineures                                          | Majeures           |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Patient</b>      | Anonyme (juste date de naissance)<br>255555CCCC42 | Carte vitale       |
| <b>Prescripteur</b> | 501999999 (fictif)                                | 501999999 (fictif) |
| <b>Spécificité</b>  | Exo 3                                             | Exo 3              |

