

FICHE CONSEIL



FIEVRE CHEZ L'ENFANT

Comment prendre la température ?

Avec un **thermomètre rectal** ou à défaut auriculaire.

En cas de chiffre extrême (34°C ou 42°C par exemple), n'hésitez pas à reprendre la température (en rectal).

Au-dessus de **38°C** l'enfant a de la fièvre.


Quand consulter en urgence ?



→ Si l'enfant a **moins de 3 mois** (même s'il va bien).

→ Si son état est inquiétant : trouble du **comportement** (ne joue pas, est tout mou), ou trouble de la **coloration** (pâleur, lèvres ou extrémités bleues) ou troubles de la **respiration** (signes de tirage) ou s'il est très douloureux.

→ Si apparition de **tâches rouges** sur la peau qui ne s'effacent pas en pressant légèrement dessus (idéalement avec un verre) : attention au purpura.



Présomption de purpura

→ Si vous revenez avec votre enfant d'un séjour à **l'étranger**.

Comment le soigner (en dehors des situations d'urgence) ?

→ Découvrez-le (ne pas donner de bain froid).

→ A partir de 38,5°C (et entre 38°C et 38,5°C s'il est amorphe) : donnez lui du paracétamol adapté à son poids (Doliprane®, Dafalgan®). La prise peut-être renouvelée toutes les 6 heures.

→ Proposez-lui à boire régulièrement.

→ Surveillez-le (cf. « si son état est inquiétant ») et observez sa peau.

→ Consultez un médecin si la fièvre persiste plus de 3 jours.



Source : WhyDoc et « Urgences or not Urgences »

Vidéo WhyDoc