

主成份分析的  
线性代数基础

王宁宁

线性代数基础

# 主成份分析的线性代数基础

王宁宁

广州医科大学

# 线性代数基础

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宇

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

# Cauchy-Schwarz 不等式

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## Cauchy-Schwarz 不等式

设  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{d}$  是两个任意  $p \times 1$  向量, 有:

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{b}'\mathbf{b})(\mathbf{d}'\mathbf{d})$$

则当且仅当对某个常数  $c$  有  $\mathbf{b} = c\mathbf{d}$  时, 等号成立。

## 证明

若  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{d}$  有一个为零, 则结果显然成立。

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\mathbf{b} - x\mathbf{d})'(\mathbf{b} - x\mathbf{d}) \\ &= \mathbf{b}'\mathbf{b} - x\mathbf{d}'\mathbf{b} - \mathbf{b}'(x\mathbf{d}) + x^2\mathbf{d}'\mathbf{d} \\ &= \mathbf{b}'\mathbf{b} - 2x\mathbf{b}'\mathbf{d} + x^2\mathbf{d}'\mathbf{d} \quad \left( \text{加减} \frac{(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{d}'\mathbf{d}} \right) \\ &= \mathbf{b}'\mathbf{b} - \frac{(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{d}'\mathbf{d}} + \frac{(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{d}'\mathbf{d}} - 2x\mathbf{b}'\mathbf{d} + x^2\mathbf{d}'\mathbf{d} \\ &= \mathbf{b}'\mathbf{b} - \frac{(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{d}'\mathbf{d}} + (\mathbf{d}'\mathbf{d}) \left( x - \frac{\mathbf{b}'\mathbf{d}}{\mathbf{d}'\mathbf{d}} \right)^2 \end{aligned}$$

取  $x = \frac{\mathbf{b}'\mathbf{d}}{\mathbf{d}'\mathbf{d}}$  得证。等号显然当对某个常数  $c$  有  $\mathbf{b} = c\mathbf{d}$  时成立

# 矩阵的谱分解

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 矩阵的谱分解

设  $B_{p \times p}$  是任意一个正定矩阵，有：

$$B = \lambda_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' + \lambda_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2' + \cdots + \lambda_p \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p'$$

其中  $\lambda_i, \mathbf{e}_i$ ，是  $B$  的第  $i$  个特征根及相应的特征向量。

# 矩阵的谱分解

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 矩阵的谱分解

设  $B_{p \times p}$  是任意一个正定矩阵，有：

$$B = \lambda_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' + \lambda_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2' + \cdots + \lambda_p \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p'$$

其中  $\lambda_i, \mathbf{e}_i$  是  $B$  的第  $i$  个特征根及相应的特征向量。

## 推论

$$B^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\lambda_1} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' + \sqrt{\lambda_2} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2' + \cdots + \sqrt{\lambda_p} \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p'$$
$$B^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' + \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2' + \cdots + \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p'$$

# 广义 Cauchy-Schwarz 不等式

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 广义 Cauchy-Schwarz 不等式

设  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{d}$  是两个任意  $p \times 1$  向量,  $\mathbf{B}_{p \times p}$  是正定矩阵, 有:

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{b}'\mathbf{B}\mathbf{b})(\mathbf{d}'\mathbf{B}^{-1}\mathbf{d})$$

则当且仅当对某个常数  $c$  有  $\mathbf{b} = c\mathbf{B}^{-1}\mathbf{d}$  时, 等号成立。

# 广义 Cauchy-Schwarz 不等式

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 广义 Cauchy-Schwarz 不等式

设  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{d}$  是两个任意  $p \times 1$  向量,  $\mathbf{B}_{p \times p}$  是正定矩阵, 有:

$$(\mathbf{b}'\mathbf{d})^2 \leq (\mathbf{b}'\mathbf{B}\mathbf{b})(\mathbf{d}'\mathbf{B}^{-1}\mathbf{d})$$

则当且仅当对某个常数  $c$  有  $\mathbf{b} = c\mathbf{B}^{-1}\mathbf{d}$  时, 等号成立。

## 证明

只需注意到:

$$\mathbf{b}'\mathbf{d} = \mathbf{b}'\mathbf{I}\mathbf{d} = \mathbf{b}'\mathbf{B}^{\frac{1}{2}}\mathbf{B}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{d} = (\mathbf{B}^{\frac{1}{2}}\mathbf{b})'(\mathbf{B}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{d})$$

用  $\mathbf{B}^{\frac{1}{2}}\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{B}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{d}$  替换  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{d}$  利用 Cauchy-Schwarz 不等式即得。



# 二次型极大化

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 二次型极大化

设  $B_{p \times p}$  是任意一个正定矩阵,  $d_{p \times 1}$  是任意给定的向量, 对任意  $x_{p \times 1}$  有:

$$\max \frac{(x'd)^2}{x'Bx} \leq b'B^{-1}d$$

则当且仅当对某个常数  $c$  有  $x = cB^{-1}d$  时, 等号成立。

# 二次型极大化

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 二次型极大化

设  $B_{p \times p}$  是任意一个正定矩阵,  $d_{p \times 1}$  是任意给定的向量, 对任意  $x_{p \times 1}$  有:

$$\max \frac{(x'd)^2}{x'Bx} \leq b'B^{-1}d$$

则当且仅当对某个常数  $c$  有  $x = cB^{-1}d$  时, 等号成立。

## 证明

利用广义 Cauchy-Schwarz 不等式有:

$$(x'd)^2 \leq (x'Bx)(b'B^{-1}d)$$

利用  $x'Bx$  除以上式两边即得结论, 而且当  $x = cB^{-1}d$  时, 达到上界。

# 单位球面上二次型极大化

主成份分析的  
线性代数基础

王宇宁

线性代数基础

Cauchy-Schwarz  
不等式

矩阵的谱分解

广义  
Cauchy-Schwarz  
不等式

二次型极大化

单位球面上二次型极  
大化

## 单位球面上二次型极大化

设  $B_{p \times p}$  是任意一个正定矩阵, 其特征值为

$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$ , 相应的特征向量为  $e_1, e_2, \cdots, e_p$ ,

对任意单位向量  $x_{p \times 1}$  有:

$$\max_{x \neq 0} \frac{x' B x}{x' x} = \lambda_1 \quad \text{当 } x = e_1 \text{ 时达到}$$

$$\min_{x \neq 0} \frac{x' B x}{x' x} = \lambda_p \quad \text{当 } x = e_p \text{ 时达到}$$

特别的:

$$\max_{x \perp e_1, \cdots, e_k} \frac{x' B x}{x' x} = \lambda_{k+1} \quad \text{当 } x = e_{k+1} \text{ 时达到}$$

## 证明

只证第一式：设  $B^{\frac{1}{2}} = P\Lambda P'$ ,  $y = P'x$ , 其中  $P$  是正交阵

$$\begin{aligned}\max_{x \neq 0} \frac{x' B x}{x' x} &= \frac{x' B^{\frac{1}{2}} B^{\frac{1}{2}} x}{x' P P' x} = \frac{x' P \Lambda P' P \Lambda P' x}{y' y} \\ &= \frac{y' \Lambda y}{y' y} = \frac{\sum_{i=1}^p \lambda_i y_i^2}{\sum_{i=1}^p y_i^2} \leq \lambda_1 \frac{\sum_{i=1}^p y_i^2}{\sum_{i=1}^p y_i^2} = \lambda_1\end{aligned}$$

当  $x = e_1$  时：

$$\frac{e_1' B e_1}{e_1' e_1} = e_1' B e_1 = \lambda_1$$