

Chapitre 17

Compléments en topologie et optimisation

1 Topologie produit, topologie induite

1.1 Produit fini d'espaces vectoriels normés

Proposition 1. Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ des espaces vectoriels normés par des normes $\|\cdot\|_1, \dots, \|\cdot\|_p$ respectivement. Alors l'espace produit $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est normé par :

$$N_\infty : (x_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto \max_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i$$

Définition 1. La topologie (c'est-à-dire l'ensemble des ouverts) obtenue sur $(E_1 \times \dots \times E_p, N_\infty)$ est appelée *topologie produit* des espaces vectoriels normés $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_p, \|\cdot\|_p)$.

Remarques :

- En considérant $E_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$ on retrouve la norme $\|\cdot\|_\infty$ de $\mathbb{K}^p$.
- On peut envisager aussi d'autres normes sur l'espace produit $E_1 \times \dots \times E_p$ en s'inspirant notamment des autres normes usuelles sur $\mathbb{K}^p$. Par exemple :

$$N_1 : (x_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto \sum_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i \quad \text{ou encore} \quad N_2 : (x_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto \sqrt{\sum_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i^2}$$

On peut montrer que toutes les normes obtenues en adaptant ainsi une norme de $\mathbb{K}^p$ sont équivalentes sur $E_1 \times \dots \times E_p$, et donnent donc la même topologie sur cet espace produit.

1.2 Suite dans un produit fini d'espaces

Proposition 2. Soient $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_p, \|\cdot\|_p)$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et soit $E = E_1 \times \dots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit, muni de la norme $N_\infty : (x_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto \max_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i$.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E et $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p) \in E$. Alors $(x_n)_n$ converge vers ℓ si, et seulement si, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la suite $(x_n^{(i)})_n$ converge vers ℓ_i dans $(E_i, \|\cdot\|_i)$.

Dans le cas $E_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$, E est l'espace $\mathbb{K}^p$ et N_∞ est la norme $\|\cdot\|_\infty$. Le résultat précédent dit alors que la convergence d'une suite de $\mathbb{K}^p$ (au sens de $\|\cdot\|_\infty$) se ramène à la convergence de chacune des p composantes, qui sont des suites de $\mathbb{K}$. C'est là un point que nous avons déjà abordé.

Corollaire 1. En reprenant les notations précédentes :

- Soit pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $A_i \subset E_i$ un ouvert de E_i . Alors $A_1 \times \dots \times A_p$ est un ouvert de E .
- Soit pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $F_i \subset E_i$ un fermé de E_i . Alors $F_1 \times \dots \times F_p$ est un fermé de E .

Remarque : Attention, les réciproques sont fausses ! Un ouvert (*resp.* un fermé) de E ne s'écrit pas nécessairement comme un produit d'ouverts (*resp.* de fermés) de $E_1, \dots, E_p$.

Exercice 1. Montrer que tout ouvert de E peut s'écrire comme la réunion d'une famille de produits d'ouverts de $E_1, \dots, E_p$.

Remarque : Pour $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$, Le graphe de f est une partie de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, ce qu'on identifie à $\mathbb{R}^{n+p}$. Par exemple avec $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}$, on peut écrire explicitement

$$G_f = \{(x, y, f(x, y)), (x, y) \in \mathcal{U}\}$$

Proposition 11. Si $f : \mathcal{U} \rightarrow F$ est différentiable en a , alors l'ensemble des vecteurs tangents en $(a, f(a))$ à G_f est :

$$T_{(a, f(a))}G_f = \{(v, df(a) \cdot v), v \in E\}$$

C'est donc un sous-espace vectoriel de $E \times F$, image de l'application linéaire $v \mapsto (v, df(a) \cdot v)$.

Démonstration : Un arc $\omega :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G_f$ s'écrit $t \mapsto (\gamma(t), f(\gamma(t)))$, et un vecteur tangent en $(a, f(a))$ s'écrit donc $\omega'(0)$ pour un tel arc dérivable en 0 et vérifiant $\gamma(0) = a$, de sorte que $\omega'(0) = (v, df(a) \cdot v)$, en notant $v = \gamma'(0)$. Réciproquement, pour un tel vecteur avec $v \in E$, on a $\omega'(0) = v$ pour $\omega : t \mapsto (a + tv, f(a + tv))$, qui est bien défini au voisinage de 0 et à valeur dans G_f .

Remarques :

- Cette application linéaire est nécessairement injective et on a donc $\dim(T_{(a, f(a))}G_f) = \dim(E)$.
- Dans le cas d'une application à une variable réelle $f : I \rightarrow F$, on retrouve que $T_{(a, f(a))}G_f = \mathbb{R}(1, f'(a))$: c'est une droite vectorielle de $\mathbb{R} \times F$.
- En particulier, pour une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, l'espace tangent au graphe de f au point $(a, f(a))$ est la droite vectorielle d'équation $y = f'(a)x$. Il ne s'agit donc pas de ce qu'on appelle communément la "droite tangente à la courbe", qui est une droite affine d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- De façon générale, l'ensemble géométriquement "tangent" au graphe de f au point $(a, f(a))$ est le sous-espace affine passant par $(a, f(a))$ et dirigé par $T_{(a, f(a))}G_f$.

Exercice 6. Expliciter l'espace tangent en $(a, b, f(a, b))$ d'une application différentiable $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\mathcal{U}$ ouvert de $\mathbb{R}^2$, à l'aide des dérivées partielles. Appliquer au cas où $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

Voyons maintenant le cas d'une partie X définie implicitement par une équation mettant en jeu une application différentiable.

Proposition 12. Soit $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $X = \{x \in \mathcal{U} \mid f(x) = 0\}$. Si $a \in X$ et $df(a) \neq 0$, alors :

$$T_a X = \text{Ker}(df(a))$$

Dans le cas où E est euclidien, on a, de façon équivalente :

$$T_a X = (\nabla f(a))^\perp$$

Remarque : L'inclusion $T_a X \subset \text{Ker}(df(a))$ est facile à vérifier. La démonstration de l'inclusion réciproque, qui s'appuie sur la condition $df(a) \neq 0$, est plus difficile et hors-programme.

Exemple : Pour une surface de $\mathbb{R}^3$ définie par une équation $f(x, y, z) = 0$, avec $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable, le plan tangent à un point $A = (a, b, c)$ de la surface a pour équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(A)x + \frac{\partial f}{\partial y}(A)y + \frac{\partial f}{\partial z}(A)z = 0$$

Exercice 7. Appliquer au cas de la surface S définie par l'équation $x^2 + y^2 - z = 0$.

Si a est un point critique de f , on a $T_{(a, f(a))}G_f = E \times \{0_F\}$

