

A
Percent of variance retained, one spectrum predicting another
100 is a perfect account; 0 is no better than the target's own average; below 0 is worse than that
Spectrum being predicted
Influenza H3N2
Influenza H1N1
K80 (kappa=2)
E. coli
JC69 (flat)
Human
S. cerevisiae
SARS-CoV-2
85 83 44 34 23 11 4 -61
83 85 45 32 27 5 3 -67
-28 -22 76 69 65 17 49 -112
-43 -42 64 70 48 44 60 -65
-80 -66 66 51 77 -27 39 -128
-22 -26 39 53 18 67 53 -6
-81 -79 47 58 40 45 67 -22
-33 -34 17 26 13 26 35 69
Spectrum used as the predictor, averaged over codons and rebuilt
% of variance retained
100
50
0
−50
−100
B
Best generic stand-in, by correlation
scored against the other 6 spectra
E. coli
6 nt params
K80 (kappa=2)
1 nt params
S. cerevisiae
6 nt params
Human
6 nt params
JC69 (flat)
0 nt params
SARS-CoV-2
12 nt params
Influenza H3N2
12 nt params
0.812
0.792
0.761
0.708
0.686
0.528
0.494
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Mean Pearson r against every other spectrum