The lineage-defining replacements in the fine-tuning corpus

how much of the new lineage the model had already read

Replacement	Change	Sequences with it	Share of training data	In H3	Share of H3	In the human subset	Share of human subset	First seen
HA1:K2N	K → N	372	4.6%	268	10.6%	10	0.8%	1956
HA1:T135K	T → K	231	2.9%	63	2.5%	26	2.0%	1956
HA1:S144N	S → N	1,397	17.2%	1,061	41.9%	870	67.9%	1957
HA1:N158D	N → D	368	4.5%	89	3.5%	4	0.3%	1942
HA1:I160K	I → K	1,764	21.8%	1,714	67.7%	1,185	92.4%	1975
HA1:Q173R	Q → R	146	1.8%	24	0.9%	5	0.4%	1902
HA1:K189R	K → R	335	4.1%	302	11.9%	26	2.0%	1977
HA1:T328A	T → A	70	0.9%	16	0.6%	0	0.0%	1974
HA2:S49N	S → N	2,345	29.0%	2,114	83.6%	1,276	99.5%	1956

8,099 training sequences collected up to 2015-02-27; 2,530 of them H3, of which 1,282 are human H3N2, the human subset.
Every share is over its whole group. HA1:K2N is the one site not every sequence reaches (6,757 readable), so its share is a floor: 372 / 6,757 = 5.5% of those readable.