

PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (CKP7366)

Prof. João Paulo Pordeus Gomes


DISTRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE V.A.

Distribuições de funções de v.a.

- Dada a distribuição de X , encontre a distribuição de $Y=g(X)$
 - Caso discreto
 - Caso contínuo
 - Caso geral
 - Funções lineares
- Dada a distribuição conjunta de X e Y , encontre a distribuição de $Z=g(X,Y)$


Caso Discreto

- $Y=g(X)$




Caso Discreto

- $Y=g(X)$
- $p_Y(4) = P(Y = 4) =$




Caso Discreto

- $Y=g(X)$
- $p_Y(4) = P(Y = 4) = p_X(4) + p_X(5)$





Caso Discreto

- $Y=g(X)$
- $p_Y(4) = P(Y = 4) = p_X(4) + p_X(5)$
- $p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x)$





Função Linear

- $Z = 2X$




Função Linear

- $Z = 2X$




Função Linear

- $Z = 2X$





- $Y = 2X+3$




Função Linear

- $Z = 2X$





- $Y = 2X+3$




Função Linear

- $Z = 2X$





- $Y = 2X + 3$




$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(2X + 3 = y)$$

Função Linear

- $Z = 2X$



- $Y = 2X + 3$





$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(2X + 3 = y)$$
$$P\left(X = \frac{y - 3}{2}\right) = p_X\left(\frac{y - 3}{2}\right)$$


$$Y = aX + b \quad p_Y(y) = p_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

Exercício


- As variáveis aleatórias X e Y obedecem uma relação linear do tipo $Y = aX + b$. Dadas as seguintes distribuições, encontre os valores de a e b .




Caso contínuo (função linear)




Caso contínuo (função linear)




$$Y=2X$$




Caso contínuo (função linear)




$$Y=2X$$




Caso contínuo (função linear)





$$Y=2X$$




$$Y=2X+3$$



Caso contínuo (função linear)



$Y=2X+3$



Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$

Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$
- $P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$

Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$
- $P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = f_X(x)$$

Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$
- $P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a}$

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = f_X(x)$$

Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$
- $P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a}$
- $a < 0$
- $P\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $f_Y(y) = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a}$

Função linear de uma v.a.

- $Y = aX + b$
- $a > 0$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$
- $P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a}$
- $a < 0$
- $P\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- $f_Y(y) = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a}$

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{|a|}$$

$$p_Y(y) = p_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Exercício

- Seja X uma v.a. exponencial e seja Y uma v.a. em que $Y = aX + b$. Determine para que valores de a e b , Y ainda será exponencial.

Função linear de uma v.a Normal

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
- $Y = aX + b$

Função linear de uma v.a Normal

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
- $Y = aX + b$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{|a|}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2/2\sigma^2}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{\sigma|a|\sqrt{2\pi}} e^{-(y-b-a\mu)^2/2a^2\sigma^2}$

Função linear de uma v.a Normal

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
- $Y = aX + b$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{|a|}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2/2\sigma^2}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{\sigma|a|\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\boxed{b-a\mu})^2/\boxed{2a^2\sigma^2}}$

Média

Variância

Função linear de uma v.a Normal

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
- $Y = aX + b$
- $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{|a|}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2/2\sigma^2}$
- $f_Y(y) = \frac{1}{\sigma|a|\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\boxed{b-a\mu})^2/\boxed{2a^2\sigma^2}}$
Média Variância



se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2, \sigma^2)$

Uma função qualquer $Y=g(X)$ de uma v.a.

- Processo com duas etapas
 - Encontrar a CDF de Y
 - Derivar Y para encontrar a PDF



Exemplo

- Seja $Y = X^3$; onde X é uma v.a. $U(0,2)$



Exemplo



- Seja $Y = X^3$; onde X é uma v.a. $U(0,2)$



- $F_Y(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3})$

Exemplo



- Seja $Y = X^3$; onde X é uma v.a. $U(0,2)$



- $F_Y(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3})$
- $F_Y(y) = F_X\left(y^{\frac{1}{3}}\right) = \frac{1}{2}y^{\frac{1}{3}}$

Exemplo

- Seja $Y = X^3$; onde X é uma v.a. $U(0,2)$



- $F_Y(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3})$

- $F_Y(y) = F_X\left(y^{1/3}\right) = \frac{1}{2}y^{1/3}$

- $f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy}(y) = \frac{1}{6}y^{-2/3}$

Exercício

- Na academia você ajusta a esteira para uma velocidade entre 5 e 10Km/h de acordo com a distribuição $U(5,10)$. Encontre a PDF do tempo gasto para percorrer 10Km.

Exercício

- Na academia você ajusta a esteira para uma velocidade entre 5 e 10Km/h de acordo com a distribuição $U(5,10)$. Encontre a PDF do tempo gasto para percorrer 10Km.
- $f_Y(y) = \frac{2}{y^2}$

DÚVIDAS?
