OPTIMISATION - fiche d'examen

CN/CS = condition nécessaire/suffisante ⚠ = précision absente des slides ★ = astuce hors slides

1. Cadre et vocabulaire

- Trouver $u \in X_{ad} \subset X$ tel que $J(u) \le J(v)\ \forall v \in X_{ad}$; X Hilbert ($\mathbb{R}^n$, espace fonctionnel) ou ensemble dénombrable ; $X_{ad} = K$ fermé (états admissibles : contraintes d'égalité, d'inégalité) ; J critère (coût).
- $\inf_K J$ si on ne sait pas si J admet un min, $\min_K J$ sinon. u min local de J sur K : $\exists \delta > 0,\ \forall v \in K,\ \|u-v\| \le \delta \Rightarrow J(u) \le J(v)$.
- Suite minimisante : $u_n \in K,\ J(u_n) \to \inf_K J$ (existe toujours).

2. Existence et unicité

- Déf. (dim finie) J coercive : $\lim_{|x|\to\infty} J(x) = \infty$. J sci : $\forall (u_n)$ suite de K, $u_n \to u \Rightarrow \liminf J(u_n) \ge J(u)$.
- Th 2.2.1 Hyp. $K \subset \mathbb{R}^n$ fermé, J sci et coercive sur K. $\Rightarrow J$ a au moins un point de min, et de toute suite minimisante on extrait une sous-suite qui converge vers un tel point.
- Prop 2.3.4 Hyp. K convexe, J convexe sur K. $\Rightarrow$ tout min local est global ; l'ensemble des points de min est convexe (éventuellement vide). Si de plus J strictement convexe : au plus un point de min.
- Convexes : J_1, J_2 convexes $\Rightarrow J_1 + J_2$ et $\max(J_1, J_2)$ convexes ; J convexe est continue ⚠ (en dim. finie, sur un ouvert) ; son graphe est convexe et au-dessus de ses tangentes.
- Th 2.3.9 Hyp. K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J convexe, sci et coercive sur K. $\Rightarrow$ il existe un min de J sur K (unicité non affirmée).
- Déf. J α-convexe (fortement convexe) sur K convexe : $\exists \alpha > 0,\ \forall u, v \in K,\ \forall \theta \in [0,1],\ J(\theta u + (1-\theta)v) \le \theta J(u) + (1-\theta)J(v) - \alpha \frac{\theta(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2$.
- Th 2.3.8 Hyp. K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J α-convexe continue sur K. $\Rightarrow$ il existe un unique min u, et $\forall v \in K,\ \|v-u\|^2 \le \frac{4}{\alpha}(J(v) - J(u))$; toute suite minimisante converge vers u.
- ★ Compact : dans $\mathbb{R}^n$, K fermé borné ; coercivité automatique, J continue suffit (Th 2.2.1).
- ★ α-convexité en une ligne : $\|\theta u + (1-\theta)v\|^2 = \theta\|u\|^2 + (1-\theta)\|v\|^2 - \theta(1-\theta)\|u-v\|^2$, donc $\|u\|^2$ + (affine) est 2-convexe ; $\frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$ (a coercive de cte α) est α-convexe ; $\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ est $\lambda_{\min}(A)$-convexe. Puis Th 2.3.8 : existence + unicité d'un coup.
- ★ Critère C^2 : $J''(u)(w,w) \ge \alpha\|w\|^2\ \forall u \in K, \forall w \Rightarrow J$ α-convexe ($\ge 0 \Rightarrow$ convexe) ; dans $\mathbb{R}^n$: hessienne $\ge \alpha I$.
- ★ Coercivité : $J(v) \ge c\|v\|^2 - C\|v\| - C'$ ($c > 0$) suffit.

3. Dérivées

- Déf 2.4.1 (Fréchet) J dérivable en u s'il existe $L \in V'$ (forme linéaire continue) : $J(u+w) = J(u) + L(w) + o(w)$, $\frac{|o(w)|}{\|w\|} \to 0$. $L = J'(u)$. Riesz : $L(v) = \langle p, v\rangle$, on note $p = J'(u)$. Dans $\mathbb{R}^n$: $\partial_i J(u) = L(e_i)$.
- Déf 2.4.7 J deux fois dérivable en u : J dérivable au voisinage de u et J' dérivable en u : $J'(u+w) = J'(u) + J''(u,w) + o(w)$ dans V' ; $J''(u)(w,v) := \langle J''(u,w), v\rangle$.
- Lemme 2.4.8 J deux fois dérivable $\Rightarrow J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2)$.
- ★ En pratique : $\langle J'(u), w\rangle = \frac{d}{dt}J(u+tw)|_{t=0}$ (même en dim. infinie), puis lire la forme linéaire en w.
- ★ $J = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$, a sym. : $\langle J'(u), w\rangle = a(u,w) - L(w)$, $J''(u)(v,w) = a(v,w)$. Dans $\mathbb{R}^n$: $\nabla(\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x) = Ax - b$ (A sym. ; sinon $\frac{1}{2}(A + {}^tA)x - b$), $\nabla^2 = A$; $\nabla\|Bx - c\|^2 = 2\,{}^tB(Bx - c)$.
- ★ $(\int |\nabla u|^4)'w = 4\int |\nabla u|^2 \nabla u \cdot \nabla w$; $(M^{-1})'H = -M^{-1}HM^{-1}$; $\det'(M)H = \mathrm{tr}({}^t\mathrm{com}M\,H)$.

4. Conditions d'optimalité

- Th 2.5.1 (inéquation d'Euler) Hyp. K convexe, $u \in K$, J dérivable en u.
  [CN] Si u min local de J sur $K \Rightarrow \langle J'(u), v-u\rangle \gtrless \ge 0\ \forall v \in K$.
  [CS] Si $u \in K$ vérifie cette inégalité et J convexe $\Rightarrow u$ min global sur K.
- Déf 2.5.4 Cône des directions admissibles en $u \in K$: $K(u) = \{w \in V : \exists u_n \in K \to u,\ \exists \varepsilon_n \searrow 0,\ \frac{u_n - u}{\varepsilon_n} \to w\}$.
- Prop 2.5.5 [CN] Hyp. J dérivable en u. Si u min local de J sur $K \Rightarrow \langle J'(u), w\rangle \ge 0\ \forall w \in K(u)$.
- ★ $K = V$ (sans contrainte) : Euler $\Leftrightarrow J'(u) = 0$. K sous-espace affine $u_0 + E$: $J'(u) \in E^\perp$.

5. Égalités : Euler-Lagrange

- $K = \{v \in V : F_1(v) = \dots = F_M(v) = 0\}$. Si les F_i sont dérivables en u : $K(u) \subset \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$.
- Th 2.5.6 [CN] Hyp. $u \in K$, J dérivable en u, F_i C^1 au voisinage de u, $(F_i'(u))$ linéairement indépendants (cas régulier). Si u min local de J sur $K \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \in \mathbb{R}$ (multiplicateurs de Lagrange) : $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$.
- Prop 2.5.13 [CN] d'ordre 2. Hyp. celles du Th 2.5.6 + J, F_i deux fois continûment dérivables au voisinage de u ; λ = multiplicateurs du Th 2.5.6. Si u min local de J sur $K \Rightarrow (J''(u) + \sum \lambda_i F_i''(u))(w,w) \ge 0\ \forall w \in K(u)$.
- Fonctions implicites (preuve) : $\partial_1 F(u) \ne 0 \Rightarrow$ près de u, $F = 0 \Leftrightarrow u_1 = f(\tilde{u})$; tout chemin $\tilde{U}(t)$ donne le chemin admissible $(f(\tilde{U}(t)), \tilde{U}(t))$.
- ★ Vérifier « $(F_i'(v))$ libre » en tout $v \in K$ (u est inconnu) ; ex. sphère : $\nabla(|x|^2 - 1) = 2x \ne 0$. Points où la famille est liée ; candidats à examiner à part.
- ★ Prop 2.5.13 par contraposée : s'il existe $w \in \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$ (= $K(u)$ en cas régulier) avec $(J'' + \sum \lambda_i F_i'')(u)(w,w) < 0$, alors u n'est pas min local : on élimine des candidats. Un min global est min local : pas besoin de CS.
- ★ ~~Raleigh~~ Rayleigh : $\min_{|x|=1} Ax\cdot x = \lambda_{\min}(A)$ (A sym.), atteint aux vecteurs propres (Lagrange : $2Ax = 2\lambda x$).

6. Inégalités : KKT

- $K = \{v \in V : F_1(v) \le 0, \dots, F_M(v) \le 0\}$. Déf 2.5.14 Contraintes actives : $I(u) = \{i : F_i(u) = 0\}$.
- Si $I(u) \ne \emptyset$: $K(u)$ = cône tangent des directions rentrantes, $K(u) \subset \{d : \langle F_i'(u), d\rangle \le 0,\ i \in I(u)\}$.
- Déf 2.5.15 Contraintes qualifiées en $u \in K \Leftrightarrow \exists \bar{w} \in V,\ \forall i \in I(u) : \langle F_i'(u), \bar{w}\rangle < 0$ si F_i non linéaire, $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle = 0$ si F_i affine.
- Lemme Hyp. $I(u) \ne \emptyset$, $(F_i'(u))_{i \in I(u)}$ libre. $\Rightarrow$ contraintes qualifiées en u.
- Th 2.5.17 (KKT) [CN] Hyp. J, F_i dérivables en u, contraintes qualifiées en u. Si u min local de J sur $K \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \ge 0$: $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$ et $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- Th 2.5.24 (KKT généralisé) [CN] $K = \{G_1 = \dots = G_N = 0,\ F_1 \le 0, \dots, F_M \le 0\}$. Hyp. J, G_i, F_i dérivables en u, $(G_i'(u))_{i \le N}$ libre, $\exists \bar{w} \in \bigcap_i (G_i'(u))^\perp$: $\langle F_j'(u), \bar{w}\rangle < 0$. Si u min local $\Rightarrow \exists \mu \in \mathbb{R}^N, \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: $J'(u) + \sum \mu_i G_i'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0, \lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- ★ Qualification rapide : (a) contraintes toutes affines $\Rightarrow$ qualifiées partout ($\bar{w} = 0$) ; (b) Slater : F_i convexes et $\exists v_0,\ F_i(v_0) < 0\ \forall i \Rightarrow$ qualifiées en tout $u \in K$ ($\bar{w} = v_0 - u$: $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle \le F_i(v_0) - F_i(u) < 0$; la déf. du livre accepte aussi < 0 pour F_i affine) ; (c) gradients actifs libres (Lemme).
- ★ Gradients actifs liés : le Lemme ne conclut pas, revenir à la Déf 2.5.15. Non-qualification typique : pointe du domaine (bords tangents), ex. $0 \le y \le (1-x)^3$ en $(1,0)$; ou $x^2 \le 0$ en 0.
- ★ → Méthode : (1) existence ; (2) points non qualifiés → candidats (KKT ne dit rien sur eux : ne jamais les éliminer avec KKT) ; (3) KKT aux points qualifiés, par cas sur les contraintes actives, en commençant par une équation qui force un $\lambda_i > 0$ (donc $F_i(u) = 0$) ; (4) comparer J sur les candidats.
- ★ Cas convexe (J, F_i convexes dérivables) : KKT $\Rightarrow$ u min global (CS). Preuve : $\mathcal{L}(\cdot, \lambda)$ convexe de dérivée nulle en u, donc $\forall v \in K, J(v) \ge \mathcal{L}(v,\lambda) \ge \mathcal{L}(u,\lambda) = J(u)$.
- ★ Toujours écrire $F_i \le 0$ ($x \ge 0$ devient $-x \le 0$) et un min ($\max f = -\min(-f)$), sinon les signes des λ_i sont faux.

7. Lagrangien et dualité

- Déf 2.5.50 $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \sum \mu_i F_i(v)$, $(v,\mu) \in V \times (\mathbb{R}^+)^M$.
- Lemme 2.5.21 $\inf_{F_i(v) \le 0} J(v) = \inf_{v \in V} \sup_{\mu \in (\mathbb{R}^+)^M} \mathcal{L}(v,\mu)$.
- Déf 2.6.7 $I(v) = \sup_{\mu \ge 0} \mathcal{L}(v,\mu)$, $G(\mu) = \inf_{v \in V} \mathcal{L}(v,\mu)$. Primal : $\inf_V I$ (c'est le problème initial $\inf_{F \le 0} J$). Dual : $\sup_{\mu \ge 0} G$. Toujours $\inf I \ge \sup G$; la différence est le saut de dualité.
- Th 2.6.9 (dualité convexe) Hyp. J, F_i convexes, u solution du primal. $\Rightarrow \exists \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: (u,λ) point-selle de $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}^+)^M$ et $I(u) = \min_v I(v) = \max_\mu G(\mu) = G(\lambda)$. ⚠ (il faut aussi les contraintes qualifiées en u ; sinon faux ; $\min x$ s.c. $x^2 \le 0$, $\sup G = 0$ non atteint) (point-selle : $\mathcal{L}(u,\mu) \le \mathcal{L}(u,\lambda) \le \mathcal{L}(v,\lambda)\ \forall v, \mu$).
- ★ → Dualité en pratique : (1) $v_\mu = \mathrm{argmin}_v \mathcal{L}(\cdot,\mu)$ ($\nabla_v \mathcal{L} = 0$ si $\mathcal{L}(\cdot,\mu)$ convexe) ; (2) $G(\mu) = \mathcal{L}(v_\mu, \mu)$, toujours concave (inf de fonctions affines de μ) ; (3) $\lambda = \arg\max_{\mu \ge 0} G$; (4) $u = v_\lambda$; (5) vérifier $J(u) = G(\lambda)$ et justifier : convexe + qualifié (Slater). Certificat : $v \in K$, $\mu \ge 0$, $J(v) = G(\mu) \Rightarrow$ les deux sont optimaux.
- ★ $\min \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ s.c. $Bx \le c$ (A sym. déf. pos.) : $v_p = A^{-1}(b - {}^tBp)$, $G(p) = -\frac{1}{2}BA^{-1}{}^tBp\cdot p + (BA^{-1}b - c)\cdot p - \frac{1}{2}A^{-1}b\cdot b$; B de rang $m \Rightarrow G$ strictement concave, λ unique.

8. Algorithmes sans contraintes

- Gradient à pas fixe : $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n)$, $u_0 \in V$.
- Th 3.2.6 Hyp. J α-convexe différentiable, J' L-lipschitzien sur V ($\|J'(u) - J'(v)\| \le L\|u-v\|$), $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow \forall u_0,\ u_n \to u$ (le min) et $\|u_n - u\| \le \gamma^n \|u_0 - u\|$, $\gamma = \sqrt{1 - 2\alpha\mu + \mu^2 L^2} < 1$.
- Déf 3.3.19 J convexe sur $\mathbb{R}^n$: sous-différentiel $\partial J(x) = \{p : J(y) - J(x) \ge p\cdot(y-x)\ \forall y\}$ (sous-gradients). J dérivable en $x \Rightarrow \partial J(x) = \{J'(x)\}$; $0 \in \partial J(x) \Rightarrow x$ min de J ; $J = \sup_\lambda J_\lambda$ (J_λ convexes dérivables) : si $J(x) = J_\lambda(x)$, alors $J_\lambda'(x) \in \partial J(x)$.
- Sous-gradient : $x_{n+1} = x_n - \rho_n \frac{p_n}{\|p_n\|}$, $p_n \in \partial J(x_n)$. Prop 3.3.23 Hyp. J convexe, coercive, $\partial J(x) \ne \emptyset$ partout, localement lipschitzienne ($\forall M, \exists L_M : \|x\| + \|y\| \le M \Rightarrow |J(x) - J(y)| \le L_M\|x-y\|$), $(\rho_n) \in \ell^2 \setminus \ell^1$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- Newton : racine de $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$: $u_{n+1} - u_n = -(F'(u_n))^{-1}F(u_n)$, u_0 proche de u^*, $F'(u^*)$ inversible ; minimisation (J C^2) : $u_{n+1} - u_n = -(J''(u_n))^{-1}J'(u_n)$, u_0 proche d'un point critique u^*, $J''(u^*)$ inversible.
- Prop 3.5.1 Hyp. F C^2 de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, u^* zéro régulier ($F(u^*) = 0$, $F'(u^*)$ inversible). $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$, $0 < C < 1/\varepsilon$: si $\|u^* - u_0\| \le \varepsilon$, convergence quadratique $\|u_{n+1} - u^*\| \le C\|u_n - u^*\|^2$.
- ★ Quadratique ($J'' = A$, spectre dans $[\lambda_1, \lambda_N]$) : $u_n - u = (I - \mu A)^n(u_0 - u)$; CV $\Leftrightarrow 0 < \mu < 2/\lambda_N$; $\mu_{opt} = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$, taux $\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$, $\kappa = \frac{\lambda_N}{\lambda_1}$. (Th 3.2.6 avec $\alpha = \lambda_1$, $L = \lambda_N$ est plus restrictif.)
- ★ $\partial|\cdot|(0) = [-1,1]$; $\partial\|\cdot\|(0) = \bar{B}(0,1)$, $\partial\|\cdot\|(x) = \{x/\|x\|\}$ si $x \ne 0$; J_1 dérivable : $\partial(J_1 + J_2)(x) = J_1'(x) + \partial J_2(x)$.

9. Algorithmes sous contraintes

- Newton, égalités $\min_{G(v)=0} J$: un min est point critique du Lagrangien, $\nabla\mathcal{L}(u,\lambda) = (J'(u) + \lambda G'(u), G(u)) \in V \times \mathbb{R}^M$; $\mathcal{L}''(u,\lambda)(v,p;w,q) = J''(u)(v,w) + \lambda\cdot G''(u)(v,w) + q\cdot(G'(u),v) + p\cdot(G'(u),w)$; si $V = \mathbb{R}^n$: $\mathcal{L}'' = \begin{pmatrix} J''(u) + \lambda G''(u) & {}^tG'(u) \\ G'(u) & 0 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{L}'' \ge 0 \Leftrightarrow J'' + \lambda\cdot G'' \ge 0$ sur $\bigcap_j (G_j'(u))^\perp$
  ⚠ (positivité testée sur les (v,p) avec $G'(u)v = 0$).

- Gradient projeté (K convexe fermé) : $u_{n+1} = P_K(u_n - \mu J'(u_n))$. Th 3.4.1 Hyp. J α-convexe différentiable, J' L-lipschitzien, $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- Uzawa (inégalités) : $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \mu \cdot F(v)$, $\varepsilon > 0$, $\mu_0 \in \mathbb{R}^M_+$; u_n : $\mathcal{L}(u_n,\mu_n) = \inf_v \mathcal{L}(v,\mu_n)$, puis $\mu_{n+1} = P_{\mathbb{R}^M_+}(\mu_n + \varepsilon F(u_n))$. Th 3.4.3 Hyp. J α-convexe différentiable, F convexe et L-lipschitzienne de V dans $\mathbb{R}^M$, $0 < \varepsilon < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ Uzawa converge.
- Pénalisation : $J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{\varepsilon}\sum \max(0, F_i(v))^2$ sur $\mathbb{R}^n$. Prop 3.4.6 Hyp. J continue, strictement convexe, coercive ; F_i convexes continues ; $K = \{F \le 0\} \neq \emptyset$; u unique solution, u_ε min de J_ε. $\Rightarrow u_\varepsilon \to u$ quand $\varepsilon \to 0$.
- ☆ Newton égalités : résoudre le système linéaire $\mathcal{L}''(u_n,\lambda_n)(\delta u, \delta\lambda) = -\nabla\mathcal{L}(u_n,\lambda_n)$ (en dim. infinie : une formulation variationnelle), puis $(u_{n+1},\lambda_{n+1}) = (u_n + \delta u, \lambda_n + \delta\lambda)$.
- ☆ Projections : $\mathbb{R}^n_+$: $\max(x_i, 0)$; pavé : tronquer chaque x_i ; boule $\bar{B}(0,R)$: $Rx/|x|$ si $|x| > R$; hyperplan $a \cdot x = b$: $x - \frac{a\cdot x - b}{|a|^2} a$; demi-espace $a \cdot x \le b$: $x - \frac{(a\cdot x - b)^+}{|a|^2} a$. Caractérisation (Euler) : $(x - P_K x, y - P_K x) \le 0$ $\forall y \in K$.
- ☆ Pénalisation : $u_\varepsilon \notin K$ en général (approche par l'extérieur) ; $J'_\varepsilon(u_\varepsilon) = 0$ s'écrit $J'(u_\varepsilon) + \sum \lambda_i^\varepsilon F_i'(u_\varepsilon) = 0$ avec $\lambda_i^\varepsilon = \frac{2}{\varepsilon}\max(0, F_i(u_\varepsilon))$; passer à la limite : $\lambda_i^\varepsilon \to \lambda_i$ (si $F_i'(u)$ libres).

10. EDP : espaces de Sobolev

- $\partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} u$ (au sens des distributions). Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$: $H^n(\Omega) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2, |\alpha|_1 \le n\}$; $H^1(\Omega) = \{v \in L^2 : \nabla v \in (L^2)^d\}$. Th $H^n(\Omega)$ (produit scalaire $\sum_{|\alpha|\le n} \int \partial^\alpha u \partial^\alpha v$) est un Hilbert.
- Th (dim 1) I intervalle ouvert borné : $H^1(I) \subset C^0(I)$ et $\exists C(I), \|u\|_\infty \le C\|u\|_{H^1(I)}$. Dim ≥ 2 : en général $H^1 \not\subset C^0$; $k > d/2$, Ω régulier $\Rightarrow H^k(\Omega) \subset C^0(\bar\Omega)$.
- Trace $\gamma_0 : u \mapsto u_{|\partial\Omega}$. Th Ω borné régulier $\Rightarrow \gamma_0 u$ définie p.p., $\in L^2(\partial\Omega)$, $\|\gamma_0 u\|_{L^2(\partial\Omega)} \le C_\Omega \|u\|_{H^1(\Omega)}$.
- Green (Ω borné régulier) $w, v \in H^1$: $\int_\Omega w \partial_i v = -\int_\Omega v \partial_i w + \int_{\partial\Omega} w v n_i$. $u \in H^2$, $v \in H^1$: $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + \int_\Omega (\Delta u) v = \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot n$.
- $H^1_0(\Omega)$ borné régulier) : $H^1_0(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1} = \gamma_0^{-1}(\{0\}) \neq H^1$; Hilbert pour $\|\cdot\|_{H^1}$.
- Th (Poincaré) Hyp. Ω ouvert borné (ou borné dans une direction). $\Rightarrow \exists k_\Omega$, $\forall v \in H^1_0(\Omega)$, $\|v\|_{L^2} \le k_\Omega \|\nabla v\|_{L^2}$. Faux pour $v \in H^1 \setminus H^1_0$ (non nul au bord).
- Th $(u,v) \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ est un produit scalaire sur H^1_0 (Hilbert) ; $|v|_{H^1} = \|\nabla v\|_{L^2}$ est une norme sur H^1_0, équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$.

11. EDP : Lax-Milgram

- a bilinéaire continue ($|a(u,v)| \le C\|u\|\|v\|$) et coercive ($a(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$). Th (Lax-Milgram) Hyp. H Hilbert, a continue et coercive, $L \in H'$. $\Rightarrow \exists! u \in H$: $a(u,v) = L(v)$ $\forall v \in H$. Si de plus a symétrique : u est l'unique min sur H de $\frac{1}{2}a(v,v) - L(v)$.
- $\to$ 5 étapes, (D) $-\Delta u + cu = f$, $u = 0$ sur $\partial\Omega$: (1) multiplier par v nulle au bord, Green ; (2) $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v + cuv = \int fv = \ell(v)$ dans H^1_0 muni de $\int \nabla u \cdot \nabla v$; (3) Lax-Milgram : $a(u,u) \ge |u|^2_{H^1}$, continuité par Cauchy-Schwarz + Poincaré ; (4) $v \in \mathcal{D}(\Omega)$: EDP dans $\mathcal{D}'(\Omega)$; (5) $\Delta u \in L^2$: EDP p.p.
- Th (résumé) Hyp. Ω borné régulier, $c \ge 0$ bornée, $f \in L^2$. $\Rightarrow$ (D) a une unique solution $u \in H^1_0$, et $\|u\|_{H^1} \le C_\Omega \|f\|_{L^2}$.
- ☆ Min $\leftrightarrow$ EDP : $\min_H \frac{1}{2}a(v,v) - L(v)$ (a sym.) $\Leftrightarrow$ $a(u,v) = L(v)$ $\forall v$ (Euler avec $K = H$) ; existence aussi par Th 2.3.8. Puis Green + $v \in \mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow$ EDP ; v quelconque $\Rightarrow$ conditions au bord.
- ☆ Dirichlet (u imposé au bord) : dans l'espace (H^1_0) ; Neumann ($\partial_n u$ imposé) : dans la forme via Green, espace H^1, coercivité si $c > 0$.
- ☆ Contrainte $\|u\|_{L^2} = 1$: Lagrange $\Rightarrow -\Delta u = \lambda u$ et $J(u) = \lambda$; $\min \int |\nabla v|^2 = \lambda_1$; en base propre, $\int |\nabla v|^2 = \sum \lambda_k c_k^2 \ge \lambda_1 \sum c_k^2$.

12. PL continue

- $\inf c \cdot x$ s.c. $Ax = b$, $x \ge 0$; $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $m \le n$, $\operatorname{rg} A = m$. $X_{ad} = \{x \in \mathbb{R}^n_+ : Ax = b\}$ polyèdre. $x \in X_{ad}$: solution admissible ; sommet de X_{ad} : solution extrémale.
- Lemme (1) Le problème admet une solution si l'infimum est minoré ⚠ (et $X_{ad} \neq \emptyset$). (2) Pour x extrémale ; permutation des colonnes, $A = [B\ N]$, B inversible, $x = (x_B, x_N)$, $x_N = 0$, $x_B = B^{-1}b \ge 0$: solution basique. (3) S'il existe une solution optimale, il en existe une basique.
- Prop $\bar x$ basique : $\forall x$ admissible, $c \cdot (x - \bar x) = \tilde c_N \cdot x_N$, $\tilde c_N = c_N - {}^t(B^{-1}N)c_B$ (coût réduit) ; $\bar x$ optimale $\Leftrightarrow \tilde c_N \ge 0$ ⚠ ($\Leftarrow$ toujours ; $\Rightarrow$ si $\bar x_B > 0$ (non dégénérée)).
- Rq essentielle x basique, $\tilde c_N \cdot e_i < 0$: $x(\varepsilon) = (B^{-1}(b - \varepsilon N_i), \varepsilon e_i)$ fait décroître le coût de $\varepsilon|\tilde c_N \cdot e_i|$.

13. Simplexe et dualité

- $\to$ Simplexe (1) x_k admissible basique, $A_k = [B_k\ N_k]$; $\tilde c_k = c_{k,N} - {}^t N_k\, {}^t B_k^{-1} c_{k,B}$; si $\tilde c_k \ge 0$: x_k basique optimale ; si non i = composante la plus négative. (2) a_i colonne de N_k ; $x_{k,N}(\varepsilon) = \varepsilon e_i$, $x_{k,B}(\varepsilon) = B_k^{-1}(b - \varepsilon a_i)$. (3) Si ε peut être aussi grand qu'on veut : problème non borné inférieurement. (4) Sinon ε_k maximal ($x_k(\varepsilon_k)$ admissible, pas au-delà) : une composante $j \neq i$ de $x_{k,B}(\varepsilon_k)$ s'annule ; $x_{k+1} = x_k(\varepsilon_k)$ et on échange les colonnes i et j.
- Initialisation : simplexe pour $\min 1 \cdot y$ s.c. $\tilde A x + y = \tilde b$, $(x,y) \ge 0$, $\tilde b_i = |b_i|$ ($\tilde A$ correspondant), départ $(y_0, x_0) = (\tilde b, 0)$, admissible basique.
- Dualité : $\mathcal{L}(x,p) = c \cdot x + p \cdot (b - Ax)$; $G(p) = \min_{x\ge 0} \mathcal{L}(x,p) = p \cdot b$ si $c - {}^t Ap \ge 0$, $-\infty$ sinon. Dual : $\sup b \cdot p$ s.c. ${}^t Ap \le c$, $p \in \mathbb{R}^m$.
- Th Si le primal ou le dual a une solution finie, $\Rightarrow$ l'autre aussi ; il existe un point selle $(\bar x, \bar p)$ du Lagrangien, admissible pour chacun : $\min c \cdot x = c \cdot \bar x = b \cdot \bar p = \sup b \cdot p$, et écarts complémentaires $\bar x \cdot (c - {}^t A\bar p) = 0$.
- ☆ Table de dualité (primal $\min c \cdot x$, dual $\max b \cdot p$) : contrainte $\ge b_i \leftrightarrow p_i \ge 0$; $\le b_i \leftrightarrow p_i \le 0$; $= b_i \leftrightarrow p_i$ libre ; $x_j \ge 0 \leftrightarrow ({}^t Ap)_j \le c_j$; x_j libre $\leftrightarrow ({}^t Ap)_j = c_j$. Ex. : $\min c \cdot x$, $Ax \ge b$, $x \ge 0 \leftrightarrow \max b \cdot p$, ${}^t Ap \le c$, $p \ge 0$.
- ☆ Dual à 2 variables : le résoudre graphiquement, puis écarts complémentaires ($p_i > 0 \Rightarrow$ contrainte i saturée ; contrainte duale j non saturée $\Rightarrow x_j = 0$) : système pour x.
- ☆ Simplexe à la main : $Ax \le b$ ($b \ge 0$) devient $Ax + s = b$, base de départ s ; $\varepsilon_k = \min\{(x_B)_j / d_j : d_j > 0\}$ avec $d = B^{-1}a_i$; aucun $d_j > 0 \Rightarrow$ non borné ; $\max c \cdot x = -\min(-c \cdot x)$.

14. PL en nombres entiers

- $\min_{x \in P \cap \mathbb{Z}^n} c \cdot x$, $P = \{x : Ax \le b\}$ polyèdre : quand vaut-il $\min_P c \cdot x$?
- Lemme P = enveloppe convexe de ses sommets S (points basiques) ; pour J convexe, $\min_P J = \min_S J$ ⚠ (faux pour J convexe ; vrai pour J concave, en particulier linéaire, et P borné).
- Lemme $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversible : ($\forall b \in \mathbb{Z}^n$, $A^{-1}b \in \mathbb{Z}^n$) $\Leftrightarrow \det A = \pm 1$ (unimodulaire) ; alors, si $b \in \mathbb{Z}^n$, P = enveloppe convexe de $P \cap \mathbb{Z}^n$.
- Totalement unimodulaire ($m \neq n$) : toute sous-matrice carrée est unimodulaire ou non inversible.
- Lemme Coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$, au plus un 1 et un -1 par colonne $\Rightarrow A$ TU.
- Corollaire Hyp. A TU, $b \in \mathbb{Z}^n$. $\Rightarrow$ les solutions basiques de $\min_P c \cdot x$ sont entières ; si un min existe, il est atteint en une solution basique entière.
- ☆ TU : stable par transposition, ajout de lignes ou colonnes de I, changement de signe de lignes ou colonnes ; incidence d'un graphe biparti : TU ; matrice d'intervalles (1 consécutifs dans chaque colonne, ex. centre d'appels) : TU.
- ☆ Solution entière : exhiber une solution fractionnaire de valeur v (bal : $x_{fg} = a_{fg}/r$) ; par TU, une solution basique entière fait au moins aussi bien.

15. Flots

- Graphe orienté $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$, m nœuds, n arcs ; arc (i,j) de i vers j, capacité $u_{ij} \ge 0$, coût c_{ij}, flot extérieur b_i (entrant ou sortant).
- Flot admissible : $x \in \mathbb{R}^n_+$, loi des nœuds (Kirchhoff) $b_i + \sum_{(j,i)\in\mathcal{A}} x_{ji} = \sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} x_{ij}$ $\forall i$, capacités $x_{ij} \le u_{ij}$.
- Propriété $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $A_{i,l} = 1$ si $l = (j,i)$, -1 si $l = (i,j)$, 0 sinon : la loi des nœuds s'écrit $Ax = b$ ⚠ (avec ces signes c'est $Ax = -b$) ; A est TU.
- Flot de coût minimum : $\min c \cdot x$ s.c. $0 \le x \le u$, $Ax = b$; existence si $c_{ij} \ge 0$ ou $u_{ij} < \infty$; si u et b entiers, le simplexe fournit une solution optimale entière. Ex. offre $>$ demande : ajouter un client fictif qui reçoit le stock restant à coût nul.
- Flot maximal (source s sans antécédent, puits p sans successeur) : flot admissible maximisant b_s, avec $b_p = -b_s$ (conservation globale), $b_i = 0$ sinon ; ajouter l'arc (p,s), augmenter x_{ps} tant que c'est admissible (c_{ij} inutiles).
- Chemin de coût minimum : flot de coût min avec $x_{ij} \in \{0,1\}$, $b_s = -b_p = 1$, $b_i = 0$ sinon ; le simplexe résout la relaxation $0 \le x_{ij} \le 1$, mais Dijkstra est meilleur (complexité).

16. Problèmes entiers célèbres

- Sac à dos : N objets, poids p_j, utilités u_j : $\max u \cdot x$, $x_j \in \{0,1\}$, $p \cdot x \le L$. NP-complet (complexité exponentielle) ; heuristique : algorithme glouton ; résolution exacte par Ford-Bellman.
- Programmation dynamique : $D = c_{x_0 x_1} + \cdots + c_{x_{N-1}x_N} + b_{x_N}$ (coût ou revenu d'un processus d'états x_i, graphe des transitions) ; horizon fini N, chemins issus de x_0. Principe de Bellman : tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.
- Prop Fonction valeur $v^N_{x_0}$ (horizon N), pour le min : $v^0_x = b_x$, $v^n_x = \inf_{y\in\mathcal{N}}(c_{xy} + v^{n-1}_y)$, $1 \le n \le N$.
- Sac à dos : états = poids $q \in [0, L]$, v^n_q = meilleure utilité avec les n premiers objets : $v^n_q = \max(v^{n-1}_q, u_n + v^{n-1}_{q-p_n})$ ⚠ (slides : $\max_i(u_i + v^{n-1}_{q-p_i})$, qui reprend un objet).
- Voyageur de commerce : $\min_{\sigma\in\mathcal{E}_N} \sum d(x_{\sigma(n)}, x_{\sigma(n+1)})$; binaire $x \in \{0,1\}^{\mathcal{A}}$: (1) $\sum_j x_{ij} = 2$ $\forall i$; (2) connexité $\sum_{(i,j)\in S\cap\mathcal{A}} x_{ij} \le \operatorname{card}(S) - 1$ $\forall S$; (3) $\min \sum d_{ij}x_{ij}$ s.c. (1), (2).
- Séparation-évaluation (branch and bound) : arbre des tours ; borne m initialisée par une heuristique ; borne inférieure prévisionnelle par relaxation des contraintes et dualité (relaxation lagrangienne) ; on élague les branches dont la borne prévisionnelle excède m.
- Liens logiques (binaires x_a, x_b, x_c) : pas a et b ensemble : $x_a + x_b \le 1$; au moins un : $x_a + x_b \ge 1$; $a \Rightarrow b$: $x_a \le x_b$; $a \Rightarrow (b$ et/ou $c)$: $x_a \le x_b + x_c$.
- ☆ $\to$ Prog. dyn. : état = (étape, ressource restante) [sac : capacité q ; chemin avec délai : (nœud, temps restant)] ; complexité = #états $\times$ #choix ; sac à dos en $O(NL)$ (pseudo-polynomial).
- ☆ Graphe sans circuit : nœuds dans l'ordre topologique, $v_j = \min_i(v_i + c_{ij})$, en O(#arcs) ; maximiser des gains = minimiser les coûts opposés.