

54.3%；长度在 1000m 及以上的侵蚀沟道数量 14.70 万条，占总数的 22.0%，面积 8.56 万 km²，占总面积的 45.7%。西北黄土高原区侵蚀沟道数量、长度与面积见表 6-3-2。

表 6-3-2 西北黄土高原区侵蚀沟道数量、长度与面积

侵蚀沟道 级别 ^①	沟道数量/万条			沟道长度/万 km			沟道面积/万 km ²		
	丘陵 沟壑区	高原 沟壑区	合计	丘陵 沟壑区	高原 沟壑区	合计	丘陵 沟壑区	高原 沟壑区	合计
合计	55.64	11.03	66.67	47.1	9.23	56.33	15.67	3.05	18.72
500（含）~1000m	43.31	8.66	51.97	29.76	5.97	35.73	8.43	1.73	10.16
1000m 及以上	12.33	2.37	14.70	17.34	3.26	20.6	7.24	1.32	8.56

① 侵蚀沟道级别用侵蚀沟道的长度表示。

在西北黄土高原区中，甘肃省侵蚀沟道数量最多，占区域侵蚀沟道总数的 40.3%；其次为陕西省，占 21.1%；侵蚀沟道数量最少的为宁夏回族自治区，占 2.51%。侵蚀沟道面积与数量基本一致，甘肃省和陕西省面积较大，占区域侵蚀沟道总面积的比例分别达到 28.9%和 23.9%；宁夏回族自治区、河南省及内蒙古自治区侵蚀沟道面积较小，分别占 5.3%、6.2%、7.5%。西北黄土高原区各省（自治区）侵蚀沟道数量与面积见附表 A32，各省（自治区）侵蚀沟道面积占全区沟道面积比例见图 6-3-1。




图 6-3-1 西北黄土高原区
各省（自治区）侵蚀沟道面积
占全区沟道面积比例

按西北黄土高原区侵蚀类型统计，高原沟壑区侵蚀沟道共 11.03 万条，沟道面积 3.05 万 km²；丘陵沟壑区侵蚀沟道共 55.64 万条，沟道面积 15.67 万 km²。高原沟壑区侵蚀沟道数量占侵蚀沟道总数的 16.5%，丘陵沟壑区占 83.5%。

高原沟壑区侵蚀沟道主要分布于甘肃省东部、陕西省延安南部和渭河以北、山西省南部等地区，平均沟道纵比为 20.42%，沟道沟壑密度 1.25km/km²。丘陵沟壑区依据地形地貌差异分为 5 个副区。其中，第一、第二副区主要分布于陕西省北部、山西省西北部和内蒙古自治区南部，平均沟道纵比分别为 19.93%、14.06%，沟壑密度分别为 3.4~7.6km/km²、3.0~5.0km/km²；第三、第四副区主要分布于青海省东部、甘肃省中部、河南省西部，平均沟道纵