



PREGUNTAS FRECUENTES

¿DONDE GUARDO EL FRASCO DE VIDRIO QUE ME LLEGO?

AL RECIBIR LA BOTELLA, REFRIGERARLA POR 04 HORAS ANTES DE USARLA.
MANTENERLA EN LA REFRIGERADORA. HASTA QUE SE VEA QUE SUDA DE FRIO.
LUEGO DE USARLA, DEJARLA EN EL RFRIGERADOR.

¿DONDE HAGO LA PREPARACION DE MI DOSIS DIARIA?

HAY DOS MANERAS:

1RA. TOMA X TOMA, SEGÚN LA DOSIS, EN UN VASO CON 100ML DE AGUA.

2DA. EN UNA BOTELLA DE PLASTICO O VIDRIO HERMETICA CON TAPA DE PLÁSTICO, SEGÚN LA DOSIS, CON 1 LITRO DE AGUA.

LA BOTELLA DE PLASTICO O VIDRIO DEBE FORRARSE CON UNA CINTA NEGRA O BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA QUE NO LE ENTRE LA LUZ DEL SOL.

LA BOTELLA DE PLASTICO O VIDRIO FORRADA DEBE MANTENERSE EN UN LUGAR SIN SOL NI CALOR, DE PREFERENCIA EN UN CAJÓN O ALACENA.

¿CON QUE AGUA LA TOMO?

PUEDE SER AGUA HERVIDA A TEMPERATURA AMBIENTE, AGUA DEL CAÑO FILTRADA, AGUA CIELO O SAN LUIS O LA QUE VENDAN EN SU LOCALIDAD, PERO NO MINERAL, NO SAN MATEO.

¿PUEDEN TOMARLO NIÑOS, EMBARAZADAS Y MADRES DANDO DE LACTAR?

SI, PUEDEN TOMARLO NIÑOS, CON EL PROTOCOLO ADJUNTO Y POR PESO, EMBARAZADAS Y MADRES DANDO DE LACTAR, NO HAY PROBLEMA.

INDICACIONES EXTRAS:

POR NINGÚN MOTIVO MEZCAR CON: Warfarina-Coumadina-Aspirina-Cetirizina
ESPERAR 12 a 24 HORAS ANTES DE USAR CDS

NO USAR ENVASES METÁLICOS NI CON TAPAS METÁLICAS

SI HAY MALESTAR, BAJE LA DOSIS A LA MITAD. SI ES UN FUERTE MALESTAR CORTE LA DOSIS CON UN JUGO DE NARANJA Y AL DÍA SIGUIENTE HAGA LA MITAD DE LA DOSIS, PERO NO DEJE DE TOMARLO.



IGLESIA GENESIS II
DE SALUD Y SANACION



A TOMAR EN CUENTA CON EL CDS (DIOXIDO DE CLORO)

AL RECIBIR LA BOTELLA, REFRIGERARLA, HASTA QUE SUDE DE FRIO, ANTES DE ABRIRLA.

COMO SE CONSERVA:

La botella de vidrio donde viene el CDS se mantiene refrigerada a 1° centígrado aproximadamente, sin meterlo a la nevera y alejado de las paredes del refrigerador.

La botella o toma todo con la mezcla se puede guardar en una alacena, alejada de la luz del sol y del calor, la mezcla dura de manera óptima 24 horas.

QUÉ NO COMER NI BEBER:

1. Espaciar las dosis de las comidas $\frac{1}{2}$ hora y de los medicamentos 01 hora.
2. Zumo antioxidantes esperar mínimo 06 horas, mejor evitar.
3. Preferentemente, no mezclar el CDS con: café, té, alcohol, chocolate, bicarbonato, vitamina C, ácido ascórbico, zumo de naranja, conservante o suplementos (antioxidantes), aunque no suelen hacer interacción, pueden neutralizar, como antídoto, la eficacia del Dióxido de Cloro.

ADVERTENCIAS y CONTRAINDICACIONES:

- Cuanto más enferma la persona, más lento debe ser el aumento de la dosis.
- Es tóxico por inhalación masiva, hay que evitar su respiración prolongada directa.
- Como **CONTRAINDICACIÓN** hay que tener en cuenta, **no consumir CDS si toma anti-coagulantes (Warfarina-Coumadina-Aspirina-Cetirizina).**
- El Dióxido de Cloro no aumenta la dilución de la sangre directamente, sino que aumenta la carga eléctrica en las membranas de los hematíes, activando las mitocondrias apagadas.
- Si está tomando un medicamento para una enfermedad “crónica”, se disminuye la dosis del mismo paulatinamente, comprobando los niveles de medición muy a menudo (medicación para la hipertensión, diabetes).
- Algunas personas informan acerca de síntomas parecidos a los de un resfriado cuando se utiliza CDS (mocos/flemas/diarrea leve), debido a la expulsión de toxinas, metales, virus, bacterias, patógenos y parásitos muertos.
Esto puede producirse por patógenos encapsulados en la mucosidad de la nariz o los pulmones de un resfriado anterior, llamado Biofilm. Los gérmenes a veces se encapsulan en el moco endurecido pero siguen vivos.
- El CDS puede hacer que le duela la cabeza al 0.5% de la población, según los estudios realizados, el dolor de cabeza es un síntoma directo de una infección parasitaria grave; siendo necesario un Protocolo de Desparasitación.





PROTOCOLOS CDS DIOXIDO DE CLORO

Protocolo C (CDS) Preventivo

El protocolo se puede mezclar en una botella de plástico con tapa o en toma todo hermético. (SIN METALES EN EL INTERIOR NI EN LA TAPA).

- 10 ml de CDS en 01 litro de agua por día.
(INICIAR CON 5 ML Y SUBIR 2.5ML PROGRESIVAMENTE CADA 5 DIAS)
Si hay malestar bajar a la mitad de la dosis o a la dosis anterior.
- 10 tomas de 100ml cada una, con una hora de intervalo.
- Distanciar de las comidas 1/2 hora y 01 hora de los medicamentos.
- Se puede añadir ¼ parte de agua de mar. (OPCIONAL)
- En caso de enfermedad grave, elevar la dosis de forma lenta y progresivamente, en 10 dosis separadas, tomadas a lo largo del día y según como se sienta llegar hasta 30ml por litro de agua. Subir gradualmente 5ml por semana o según su ritmo, no apresurarse.

Protocolo COVID19

Los protocolos se pueden mezclar en una botella de plástico con tapa o en toma todo hermético. (SIN METALES EN EL INTERIOR NI EN LA TAPA).

Solo SI tiene fiebre:

- Cada 15 minutos – 01 litro en 10 tomas. Protocolo (F)
Puede hacer 10 ml de CDS en un litro de agua.
- Luego continúe con el protocolo C Preventivo para limpieza y prevención.

Luego continuar el día con:

- Cada hora, 01 litro en 10 tomas. Protocolo (C)
- Continuar hasta sanar (Aproximadamente de 24 a 96 horas)
- Puede hacer 20 ml de CDS en un litro de agua.

Si NO tiene fiebre: Leer la siguiente página



IGLESIA GENESIS II
DE SALUD Y SANACION



Si NO tiene fiebre:

- **Con una hora de intervalo, 01 litro en 10 tomas. 20 ml de CDS en un litro de agua. (C)**
- Continuar hasta sanar (Aproximadamente de 24 a 96 horas).
- Luego continúe con el protocolo C Preventivo para limpieza y prevención, por un mes como mínimo.
- Si tiene malestar, trate de soportarlo, sino use solo 10ml de CDS para la toma.

PROTOCOLO URGENTE: Solo si está en riesgo su vida

- 6ML de CDS en 200 ml de agua
- después de hora y media
- se repite, con otros 6ML de CDS en 200 ml de agua
- posteriormente, se toman 3ML de CDS cada hora y media
- hasta completar 10 tomas al día

Protocolo Respiración Complementario al de COVID19

- La única manera de inhalar Dióxido de Cloro es colocando de 1ml a 2ml en un vaso de vidrio seco, y colocando el vaso a la altura del pecho. Respirar suavemente y **no acércalo a la nariz**, hacerlo de 3 a 5 minutos o hasta que sienta un **ligero picazón** en la nariz o garganta. Repetir mañana/tarde/noche según la gravedad.
- Este protocolo ayuda a abrir rápidamente los pulmones y facilita la expectoración de flemas y congestiones.

Protocolo Niños y Adolescentes

- Hay que observar el comportamiento del menor si aparece: cansancio, náuseas, dolor de barriga, vómito, hay que bajar la dosis según la sintomatología.

Para EL PROTOCOLO PREVENCIÓN EN NIÑOS solo use la mitad de la Dosis Máxima Curativa.

- **Se inicia con la mitad de la dosis y según la evolución y síntomas del niño se va subiendo 01 ml cada 02 días hasta la dosis indicada.**

- 5 kg – 3ml por día, repartido en 10 tomas – Dosis Máxima Curativa
- 15 kg – 6ml por día, repartido en 10 tomas – Dosis Máxima Curativa
- 30 kg – 8ml por día, repartido en 10 tomas – Dosis Máxima Curativa
- 40 kg – 12ml por día, repartido en 10 tomas – Dosis Máxima Curativa
- 60 kg – Dosis adulta



IGLESIA GENESIS II
DE SALUD Y SANACION



Protocolo Bucal

5 ml CDS (15 ml si es agudo) en 200 ml de agua, enjuagar boca, cepillar los dientes con la solución y hacer gárgaras 3 ó 4 veces al día durante 3 minutos. Al terminar es importante enjuagar la boca con agua.

Para inflamaciones añadir 01 ml de DMSO a la mezcla. Importante, enjuagar con agua al terminar.

Para caries: Cepilla tus dientes, encías y lengua con 5 ml de CDS activado en 30ml de agua.

Coloca 2ml en un recipiente plástico o vaso pequeño, coloca tu boca sobre la boca del recipiente. **No respire los vapores**, simplemente deja que el vapor entre en tu boca y dientes durante 3 minutos y no más.

Protocolo Detox (desintoxicar metales pesados)

- Protocolo **C** durante 29 días y descanso de 01 día.
- Repetir tratamiento cuatro meses en total.

Protocolo con Perilla (P)

- 6 ml de CDS en 150 ml de agua tibia.
- Aplicar vaselina o crema en la Punta de la perilla.
- Retener líquido tres minutos antes de evacuar.

Protocolo de Enema (E)

El CDS no ataca la flora intestinal (bacterias buenas).

El mejor procedimiento es:

- 10 ml de CDS, por cada litro de agua, templada. **NO USAR DMSO.**
- Aplicar un poco de vaselina o crema en la punta del irrigador. Mejor posición, tumbado del lado derecho. Retener líquido 3 minutos.

Recomendado combinar este protocolo con la toma de CDS.

Hacer este protocolo solo una vez al día preferiblemente por la noche, durante 1 ó 2 semanas. Se le puede añadir agua de mar, (1 parte de agua de mar, 3 de agua dulce).





Protocolo Dermatológico (D)

- Aplicar en spray el CDS (3.000 ppm) sobre la zona afectada.
- Mayor penetración combinando con DMSO.
- Primero aplicar el DMSO como frotación y luego el CDS como frotación.

Protocolo de Oftalmológico (O)

Mezclar en un frasco de cristal pequeño con gotero de polietileno.

- 50ml de suero fisiológico salino.
- 5 ml de CDS.
- Se aplican 5 gotas cada dos horas en el ojo afectado.
- Se guardan en un sitio oscuro y fresco. Su eficacia dura tres días.

Protocolo de Baño

- De 30ml a 60ml CDS activadas en la bañera, sin jabones ni aditivos. Debe durar 20 minutos y preferiblemente por la noche.
- De 2 a 4 kg de sal marina, **SIN FLUOR NI YODO**, disuelta en la bañera, absorbe los ácidos de nuestro cuerpo a través de la piel.

Protocolo de Ducha Vaginal

- 6ml de CDS en 500 ml/agua a temperatura corporal.
- Introducir sentada en la bañera y aguantar 3-5 minutos, repetir en caso necesario. (agua osmotizada o esterilizada).
- **NO REALIZAR TRATAMIENTO:** Mujeres recién operadas o que hayan dado a luz recientemente. Deben transcurrir al menos 40 días desde el parto o la intervención.
- También sirve como anticonceptivo luego de la relación sexual en el Protocolo botella: es decir, hacerlo con una botella de plástico, enjuagar y aguantar 3-5 minutos.

Protocolo Habitación (H)

- 6 o 12 mililitros de CDS (según tamaño habitación), sin agua. Deje el CDS a un metro de distancia de la persona enferma. Si se quiere ralentizar el proceso, añadir 1 cucharada de agua a la mezcla.





Protocolo Quemaduras (Q)

- 1ª vez: aplicar CDS Puro, en spray, dejar dos minutos y lavar.
- 2ª vez: cuando vuelve a aparecer el dolor CDS en spray.
- Se puede repetir cada 3 minutos (de 1 a 6 tratamientos son suficientes para una quemadura leve).

Protocolo K: como Kit combinado con DMSO

Protocolo de aplicación: En casi todas las enfermedades de la piel, como acné, Psoriasis, eczema, pie de atleta, heridas, etc.

Se usa aplicando DMSO en la piel, seguido por CDS como máximo hasta 05 veces al día, cada 02 horas. Aplicar 03 días y descansar 04, así sucesivamente.

Se agregan tres cucharaditas de DMSO + una cucharadita de agua en un vaso pequeño.

Se mezclan 20ml de CDS con unos 50 ml de agua en una botella spray.

Manteniéndolo fresco y oscuro estas soluciones estables aguantan durante varios días hasta una semana o más, en recipientes de cristal incluso meses.

Aplicar como frotación ambos productos. Realizar el tratamiento durante 30 días o según las indicaciones de su proveedor de DMSO.

Puede aparecer ligero picor, calor o rojez momentánea que es normal y desaparece Completamente, usar Aloe Vera natural para la irritación.

Aplica siempre sobre la piel limpia que esté libre de perfumes u otras sustancias.

