

Lista 02

Dados de Identificação	
Professor:	Matheus Pimenta
Disciplina:	Estatística - AS32E
Aluno:	

Tabela para valores de Z_α .

Nível de Confiança	99,73%	99%	98%	96%	95,45%	95%	90%	80%	68,27%	50%
Z_α	3,00	2,58	2,33	2,05	2,00	1,96	1,645	1,28	1,00	0,6745

- Os salários dos diretos das empresas de São Paulo distribuem-se normalmente com média de R\$8.000,00 e desvio padrão de R\$500,00. Qual a porcentagem de diretores que recebem:
 - menos de R\$ 6.470,00? **R:** 0,001107
 - entre R\$8.920,00 e R\$9.380,00? **R:** 0,0299994
- Uma máquina automática enche latas baseada em seus pesos brutos. O peso bruto tem distribuição normal com $\mu = 1000\text{g}$ e $\sigma = 20\text{g}$. As latas têm peso distribuído normalmente, com $\mu = 90\text{g}$ e $\sigma = 10\text{g}$. Qual a probabilidade de que uma lata tenha, de *peso líquido*:
 - menos de 830g? **R:** 0,0000172
 - mais de 870g? **R:** 0,9632
 - entre 860g e 920g? **R:** 0,6611
- Sejam $X_1 : N(150, 30)$, $X_2 : N(200, 20)$ e $X_3 : N(100, 14)$ independentes. Sejam $X = X_1 - X_2 + X_3$ também com distribuição normal. Calcular:
 - $P(61 \leq X \leq 70)$; **R:** 0,07758
 - $P(47 \leq X \leq 58)$. **R:** 0,4893
- Sejam $X_1 : N(180, 40)$ e $X_2 : N(160, 50)$ independentes. Sejam $X = 4X_1 - 3X_2$ também com distribuição normal. Calcular:
 - $P(X - 3\sigma \geq \mu - 100)$; **R:** 0,5119
 - $P(|X - 200| \geq 42)$; **R:** 0,4826
 - $P(|X - 210| \leq 16)$; **R:** 0,2549

5. O peso de um saco de café é uma variável aleatória que tem distribuição normal com média de 65kg e desvio padrão de 4kg. Um caminhão é carregado com 120 sacos. Qual a probabilidade de a carga do caminhão pesar (considere o peso da carga com distribuição normal):
 - entre 7.893kg e 7.910kg? **R:** 0.010966
 - mais de 7.722kg? **R:** 0,9624
6. Um elevador tem seu funcionamento bloqueado se sua carga for superior a 450kg. Sabendo que o peso de um adulto é uma variável aleatória com distribuição normal, sendo a média igual a 70kg e o desvio padrão igual a 15kg, calcule a probabilidade de ocorrer o bloqueio numa tentativa de transportar 6 adultos.
R: 0,2061
7. O peso de uma caixa de peças é uma variável aleatória com distribuição normal de probabilidade, com média de 60kg e desvio padrão de 4kg. Um carregamento de 200 caixas de peças é feito. Seja X o peso do carregamento e X tendo distribuição normal, determine:
 - (a) $P(|X - 12.100| \geq 32)$; **R:** 0,1051
 - (b) X_α tal que $P(X \geq X_\alpha) = 0,973$ **R:** 11.891,39
8. Um criador possui 5000 cabeças de vaca leiteira. Sabendo-se que cada vaca produz em média 3 litros por dia, obedecendo a uma distribuição normal, com desvio padrão de 0,5 litro, calcular a probabilidade de produzir, diariamente:
 - (a) mais de 15.110 litros; **R:** 0,000935
 - (b) entre 14.910 e 14.960 litros. **R:** 0,1238
9. Deseja-se saber qual a proporção de pessoas da população portadoras de determinada doença. Retira-se uma amostra de 400 pessoas, obtendo-se 8 portadores da doença. Definir limites de confiabilidade de 99% para a proporção populacional. **R:** 0,99 e intervalo é $P(0,2\% \leq p \leq 3,8\%)$
10. Dada uma população normal com $VAR(X) = 3$, levantou-se uma amostra de 4 elementos tais que $\sum_{i=1}^4 x_i = 0,8$. Construir um IC para a verdadeira média populacional μ ao nível de 1%. **R:** $IC(\mu, 99\%) = (-2,03; 2,43)$
11. A experiência com trabalhadores de uma certa indústria indica que o tempo necessário para que um trabalhador, aleatoriamente selecionado, realize uma tarefa é distribuído de maneira aproximadamente normal, com desvio padrão de 12 minutos. Uma amostra de 25 trabalhadores forneceu $\bar{x} = 140\text{min}$. Determinar os limites de confiança de 95% para a média μ da população de todos os trabalhadores que fazem aquele determinado serviço.
R: $IC(\mu, 95\%) = (135,3; 144,7)$
12. Em uma pesquisa de opinião, entre 600 pessoas pesquisadas, 240 responderam “sim” a determinada pergunta. Estimar a porcentagem de pessoas com essa mesma opinião na população, dando um intervalo de 95% de confiabilidade. **R:** $IC(p, 95\%) = [36,08\%; 43,92\%]$
13. Uma amostra aleatória de 80 notas de matemática de uma população com distribuição normal de 5000 notas apresenta média de 5,5 e desvio padrão de 1,25.

- (a) Qual os limites de confiança de 95% para a média das 5000 notas? **R:** $IC(\mu, 95\%) = (5, 23; 5, 77)$
- (b) Com que grau de confiança diríamos que a média das notas é maior que 5 e menor que 6? **R:** 99,97%
14. Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros consomem, em média, 11 litros por 100km, com desvio padrão de 0,8 litro. Uma revista decide testar essa afirmação e analisa 35 carros dessa marca, obtendo 11,4 litros por 100km, como consumo médio. Admitindo que o consumo tenha distribuição normal, ao nível de 10%, o que a revista concluirá sobre o anúncio da fábrica? **R:** A revista pode concluir que o anúncio não é verdadeiro.
15. A altura dos adultos de uma certa cidade tem distribuição normal com média de 164cm e desvio padrão de 5,82cm. Deseja-se saber se as condições sociais desfavoráveis vigentes na parte pobre dessa cidade causem um retardamento no crescimento dessa população. Para isso, levantou-se uma amostra de 144 adultos dessa parte da cidade, obtendo-se a média de 162cm. Pode esse resultado indicar que os adultos residentes na área são em média mais baixos que os demais habitantes da cidade ao nível de 5%? **R:** Pode-se admitir que as condições sociais desfavoráveis provocam um retardamento no crescimento da população da parte estudada.
16. Um candidato a deputado estadual afirma que terá 60% dos votos do eleitores de uma cidade. Um instituto de pesquisa colhe uma amostra de 300 eleitores dessa cidade, encontrando 160 que votarão no candidato. Esse resultado mostra que a afirmação do candidato é verdadeira, ao nível de 5%? **R:** A afirmação do candidato é falsa.
17. A vida média de uma amostra de 100 lâmpadas produzidas por uma firma foi calculada em 1570 horas, com desvio padrão de 120 horas. Sabe-se que a duração das lâmpadas dessa firma tem distribuição normal com média de 1600 horas. Ao nível de 1% testar se houve altera na duração média das lâmpadas? **R:** Não é significativa a alteração da vida média das lâmpadas.
18. De uma amostra normal com parâmetro desconhecidos, retirou-se uma amostra de 25 elementos para estimar μ , obtendo-se $\bar{x} = 15$ e $s^2 = 36$. Determinar um IC para a média ao nível de 5%. **R:** $P(12,523 < \mu < 17,477)$
19. Seja X uma variável aleatória normal com parâmetro desconhecidos. Dessa população foi retirada uma amostra $x_i : 10, 12, 14, 15, 9, 12, 16, 11, 8, 13$. Construir um IC para μ ao nível de 5%. **R:** $P(10,152 < \mu < 13,848) = 0,95$