Analysis für Informatik 2 | An2I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Taylorpolynom 2
   1.1. Berechnung 2
   1.2. Generalisierung 3
   1.3. Taylorreihe 4
   1.4. Fehlerabschätzungen 4
      1.4.1. Anwendung 5
2. Grenzwerte 6
   2.1. Eigentliche Grenzwerte im Unendlichen 6
   2.2. Eigentliche Grenzwerte im Endlichen 7
      2.2.1. Einseitige Grenzwerte 8
   2.3. Rechenregeln 8
   2.4. Uneigentliche Grenzwerte im Endlichen 9
   2.5. Satz von Bernoulli und l'Hospital 10
   2.6. Rechnen mit unendlich grossen «Zahlen» 11
3. Ableitung 11
4. Interpolation durch Splines und Polynome 11
   4.1. Notizen 12
   4.2. Bsp 12
   4.3. Methode der kleinsten Quadrate 13
   4.4. Linearer Ansatz mit Basisfunktionen 13
   4.5. Lineare Regression 14

1. TAYLORPOLYNOM

- Approximation von Funktionen durch Polynome
- Innerhalb vom Konvergenzradius sind Funktionen immer durch unendliche Polynome perfekt approximierbar

1.1. BERECHNUNG

Jede Ableitung ist die nächste Unbekannte:

$$\begin{aligned}
p(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + a_3(x-x_0)^3 \\
p'(x) &= 0 + a_1 1 + a_2 2(x-x_0) + a_3 3(x-x_0)^2 \\
p''(x) &= 0 + 0 + a_2 2 + a_3 6(x-x_0) \\
p'''(x) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 \\
p''''(x) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

x_0 einsetzen:

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= a_0 + \cancel{a_1(x_0-x_0)} + \cancel{a_2(x_0-x_0)^2} + \cancel{a_3(x_0-x_0)^3} &&= a_0 \\
p'(x_0) &= 0 + a_1 1 + \cancel{a_2 2(x_0-x_0)} + \cancel{a_3 3(x_0-x_0)^2} &&= a_1 \cdot 1 \\
p''(x_0) &= 0 + 0 + a_2 2 + \cancel{a_3 6(x_0-x_0)} &&= a_2 \cdot 2 \cdot 1 \\
p'''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 &&= a_3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\
p''''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

Somit:

$$p^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$
$$\Leftrightarrow a_n = \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

***Beispiel** 1*

$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$
Entwicklungspunkt EWP $= x_0 = 1$

NR:

$$p(x) = 3x^3 - 2x^5$$
$$p'(x) = 9x^2 - 2$$

Linearisierung:

$$p(x_0) = 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6$$
$$p'(x_0) = 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

Ergo: $p(x) \approx 6 + 7(x-1)$ = Taylor-Polynom von Grad 1
Taylor-Polynom von Grad 3: $p(x) \approx \underbrace{6 + 7(x-1)}_{\text{Linearisierung}} + ?\,(x-1)^2 + ?\,(x-1)^3$

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6 &&= a_0 && \Rightarrow a_0 = 6\\
p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 &&= 7 &&= 1 \cdot a_1 && \Rightarrow a_1 = 7\\
p''(x_0) &= 18x_0 &&= 18 &&= 1 \cdot 2 \cdot a_2 && \Rightarrow a_2 = 9\\
p'''(x_0) &= 18 &&&&= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 && \Rightarrow a_3 = 3
\end{aligned}$$

Gibt uns:

$$p(x) \approx 6 + 7(x-1) + 9(x-1)^2 + 3(x-1)^3$$

1.2. GENERALISIERUNG

Für ein Polynom $p(x)$ vom Grad n und einem Entwicklungspunkt x_0 gilt:

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Für eine Funktion $f(x)$ und einen EWP x_0 heisst

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Taylor-Polynom von Grad n für $f(x)$ um EWP x_0

***Beispiel** 2 :* $f(x) = \sin(x), x_0 = 0$



***Beobachtungen** 1*

1.1. In der Nähe des EWP x_0 gilt $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$

1.2. Je grösser n ist, umso kleiner ist der Unterschied der beiden Seiten

1.3. Der Unterschied ist umso kleiner, je näher x bei x_0 liegt

Beispiel 3 : $f(x) = e^x$, **EWP** $x_0 = 0$

Gesucht: Taylor-Polynom vom Grad n

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \Rightarrow f(0) &= e^0 = 1 \\ f'(x) &= e^x \Rightarrow f'(0) &= e^0 = 1 \\ f''(x) &= e^x \Rightarrow f''(0) &= e^0 = 1 \\ f^{(n)}(x) &= e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left((x-0)^k\right) \Leftrightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(x^k)$$

1.3. TAYLORREIHE

Die Taylor-Reihe von $f(x)$ um den Entwicklungspunkt x_0 ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Es gibt eine Zahl $R > 0$, so dass $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$, für $|x - x_0| < R$
(R = Konvergenzradius)

1.4. FEHLERABSCHÄTZUNGEN

Wie weit liegt der vom Taylor-Polynom mit Grad n vorhergesagte Funktionswert vom richtigen Wert entfernt?

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &\approx \left| \sum_{k=0}^{n+1} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \end{aligned}$$

Es gibt eine Zahl $\xi \in [x_0; x]$, so dass

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \\ &= \frac{\left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \\ &\leq \frac{\max\limits_{\xi \in [x_0;x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \end{aligned}$$

(Falls $f(x)$ nicht berechenbar)



$x_0 = \frac{a+b}{2}$, $|x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$

1.4.1. Anwendung

Gegeben: $f(x)$, Intervall $I = [a; b]$, max. Rechenfehler Δ
Gesucht: Grad des Taylor-Polynoms n, Entwicklungspunkt x_0

Antwort: $x_0 = \frac{a+b}{2} \Rightarrow |x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$
Bestimme n:

$$\frac{\max\limits_{\xi \in [x_0; x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \overset{!}{\leq} \Delta$$

$$< \frac{m}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \qquad \left| m > \max_{\xi \in [x_0; x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right| \right.$$

Beispiel 4 : **Gegeben:** $f(x) = \sin(x)$ **auf** $I = [0; \pi]$ **durch Taylor-Polynom mit Rechenfehler** $\Delta = 0.01$
berechnet werde: $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin(x) \\
f'(x) &= \cos(x) \\
f''(x) &= -\sin(x) \\
f'''(x) &= -\cos(x) \\
f''''(x) &= \sin(x) \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) &= \sin(x) \\
\Rightarrow \left| f^{(n+1)}(x) \right| &= \begin{cases} |\sin(x)| \\ |\cos(x)| \end{cases} \leq 1 \\
\Rightarrow m &= 1
\end{aligned}$$

n muss so gewählt werden, dass

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{n+1} \leq 0.01$$

1.4.1.1. Rechenregeln Fakultät

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$$

$$n! \cdot (n+1)! = (n+1)!$$

2. GRENZWERTE

2.1. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM UNENDLICHEN

Die Zahl $F \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert von $f(x)$ für x gegen ∞, wenn für alle $\varepsilon > 0$ eine «Grenze» X existiert, so dass für alle «noch grössere Zahlen» $x > X$ gilt: $|f(x) - F| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0 \wedge |f(x) - F| < \varepsilon$$
$$\Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x\to\infty} F$$

***Beobachtungen** 2*

2.1. $\forall x > X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F$

2.2. $\forall x < X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = F$

***Beispiel** 5 :* $f(x) = \arctan(x), F = \frac{\pi}{2}, X = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$

$$\forall x > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) : \left|\arctan(x) - \frac{\pi}{2}\right| < \varepsilon$$



$$\lim_{x\to\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$
$$\lim_{x\to-\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

***Beobachtungen** 3*

3.1. $|x| - F$ wird kleiner, wenn x grösser wird

3.2. Falls ε bei F anders gewählt wird, verschiebt sich X aber die Funktionswerte bleiben im Bereich $|f(x) - F|$

3.3. Falls F anders gewählt wird, kommen Funktionswerte ausserhalb vom erlaubten Bereich

Bei $\lim \to \infty$ kann man alle Terme, die sich nach 0 bewegen, ignorieren.

***Beispiel** 6 :* $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x^2-3x+5}$

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x^2-3x+5} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\frac{\left(2+\frac{3}{x}\right)}{1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}} \\
&= 0 \cdot \frac{2}{1} = 0
\end{aligned}$$

2.2. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

$\lim_{x\to q} f(x)$ = Wert der stetigen Fortsetzung von $f_{|\,D_f\setminus q}(x)$ an der Stelle $x = q$. f ist stetig in $q \Leftrightarrow \lim_{x\to q} f(x) = f(q)$

***Beispiel** 7 :* $f(x) = \dfrac{x^3+3x^2-6x-8}{x-2}$



***Beispiel** 8 :* $\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}^2(x) = 1$

$$\operatorname{sig} : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} +1 \text{ für } x>0 \\ 0 \text{ für } x=0 \\ -1 \text{ für } x<0 \end{cases} \end{cases}$$



***Beobachtungen** 4*

4.1. $\operatorname{sig}^2(x)$ ist an der Stelle 0 nicht stetig, denn $\lim_{x\to 0} f(x) \neq f(0)$

4.2. $\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}^2(x) = 1$, obwohl der Funktionswert bei $x = 0$ nicht 1 sondern $y = 0$ ist.

2.2.1. Einseitige Grenzwerte

$\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}(x)$ existiert nicht. Das ändert sich aber, wenn man den Definitionsbereich auf $\mathbb{R}^+$ oder $\mathbb{R}^-$ einschränkt.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0+} \operatorname{sig}(x) = 1$$

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ x<0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0-} \operatorname{sig}(x) = -1$$



***Beobachtungen** 5*

5.1. Wenn sich der rechtsseitige und linksseitige Grenzwert unterscheiden, existiert der beidseitige Grenzwert nicht.

2.3. RECHENREGELN

Seien $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen und $q \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ eine beliebige reelle Zahl oder Unendlich.

$$\lim_{x\to q}(c\cdot f(x)) = c\cdot \lim_{x\to q} f(x) \qquad \text{, für } c\in\mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to q}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to q} f(x) + \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}(f(x)\cdot g(x)) = \lim_{x\to q} f(x) \cdot \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x\to q} f(x)}{\lim_{x\to q} g(x)} \qquad \text{, falls } \lim_{x\to q} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x\to q}\left(f(x)^{g(x)}\right) = \left(\lim_{x\to q} f(x)\right)^{\lim_{x\to q} g(x)} \qquad \text{, falls } \lim_{x\to q} f(x) > 0$$

All diese Formeln gelten auch für einseitige Grenzwerte.

Gilt $G = \lim_{x\to q} g(x)$ (an dieser Stelle ist ein einseitiger Grenzwert nicht ausreichend), so gilt ausserdem:

$$\lim_{x\to q} f(g(x)) \lim_{g\to G} f(g)$$

falls der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

2.4. UNEIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

$$\lim_{x\to q} f(x) = \infty$$

Für jedes $S\in\mathbb{R}$ gibt es ein $\delta > 0$, so dass $\forall x : 0 < |x-q| < \delta : f(x) > S$

***Beispiel** 9 :* $f(x) = \dfrac{(x-1)^2 - 2x + 10}{(x-2)^2}$



***Beobachtungen** 6*

6.1. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x > X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

6.2. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x > X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

6.3. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x < X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$$

6.4. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x < X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

2.5. SATZ VON BERNOULLI UND L'HOSPITAL

Voraussetzung: Typ «$\frac{0}{0}$» (Zähler und Nenner streben gegen 0) oder Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»

Typ «$\frac{0}{0}$»: $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$

Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»: $\lim_{x\to a} g(x) = \infty \vee \lim_{x\to a} g(x) = -\infty$

Ableitung **ohne quotientenregel** (heisst, Zähler und Nenner separat ableiten) gibt dasselbe Resultat für den limes.

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{Voraussetzung prüfen}}{=} \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$$

Beweis für $a \in \mathbb{R}$, Typ $\frac{0}{0}$:

Linearisierung von f und g um $x = a$:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$$
$$g(x) \approx g(a) + g'(a)(x-a)$$
$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f(a) + f'(a)(x-a)}{g(a) + g'(a)(x-a)}$$
$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{\cancel{f(a)} + f'(a)\cancel{(x-a)}}{\cancel{g(a)} + g'(a)\cancel{(x-a)}} \mid f(x) \to 0 \Rightarrow f(a) = 0$$

***Beispiel** 10*

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\overbrace{1-\sin(x)}^{0}}{\underbrace{2x-\pi}_{0}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = 0$$

Einen Grenzwert vom Typ $\infty \cdot 0$ kann man mit der Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

in den typ $\frac{\infty}{\infty}$ überführen, oder durch die Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

auf die Form $\frac{0}{0}$ bringen.

2.6. RECHNEN MIT UNENDLICH GROSSEN «ZAHLEN»

	$z = -\infty$	$-\infty < z < 0$	$z = 0-$	$z = 0+$	$0 < z < \infty$	$z = \infty$
$z + \infty = \infty + z$	?	∞	∞	∞	∞	∞
$\infty - z$	∞	∞	∞	∞	∞	?
$z - \infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$z \cdot \infty = \infty \cdot z$	$-\infty$	$-\infty$	B/L*	B/L*	∞	∞
$\frac{\infty}{z}$	B/L	$-\infty$	$-\infty$	∞	∞	B/L
$\frac{z}{\infty}$	B/L	$0-$	$0-$	$0+$	$0+$	B/L
$\frac{z}{0+}$	$-\infty$	$-\infty$	B/L	B/L	∞	∞
$\frac{z}{0-}$	∞	∞	B/L	B/L	$-\infty$	$-\infty$

* Mit umformen

3. ABLEITUNG

TODO:
polish, notes 28

Differenzenquotient $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

steigung



Differentialquotient $f'(x_0) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

4. INTERPOLATION DURCH SPLINES UND POLYNOME

TODO:
everything from here on

Begriff	***Bedeutung***
Interpolation	– Füllt Lücken in einer Wertetabelle – Benötigt kein Systemverständnis ***TODO:*** diagram
Extrapolation	– Dehnt den Definitionsbereich der Funktion über den Messbereich hinaus aus – Benötigt Systemverständnis. Beispiel: Klimamodelle ***TODO:*** diagram

4.1. NOTIZEN

Recherchieren: Logistische regression

TODO:
zusammenfassung diagramme FuelPerHour/SpeedOnSurface

(Fit mit Splines vs Fit mit Parabeln $a + bx + cx^2$)

Glossar: Kostenfunktion

4.2. BSP

Gegeben: Trainingsdaten = Wertetabelle

Ziel: Vorhersage der y Werte durch x in Form einer Funktion $y = f(x)$

x	0	3	5	
y	80	90	105	← gemessene Werte
$f(x)$	$f(0)$	$f(3)$	$f(5)$	← vorhergesagte Werte
Residuen	$f(0) - 80$	$f(3) - 90$	$f(5) - 105$	← «Güte» der Vorhersage
Quadrat Fehler	$(f(0) - 80)^2$	$(f(3) - 90)^2$	$(f(5) - 105)^2$	← Schafft Vorzeichen weg

Kostenfunktion: $(f(0) - 80)^2 + (f(3) - 90)^2 + (f(5) - 105)^2 = \text{RSS}$

Definition des Suchraums: Linearkombinationen einer vorgegebenen Liste von «Basisfunktionen»

Beispiel 11 : **Schiffsfahrt**

SpeedOnSurface (x_i)	0	3	5	7.5	8	11	14	18	20	22
FuelPerHour (y_i)	80	90	105	140	131	162	197	251	280	310

TODO:



4.3. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE

Begriff	***Bedeutung***
Residuum	$r_i = f(x_i) - y_i$
Quadratischer Fehler	$r_i^2 = (f(x_i) - y_i)^2$
Unabhängige Variable	= Prädiktorvariable Variable x in der Funktion $y = f(x)$
Abhängige Variable	= Responsevariable Variable y in der Funktion $y = f(x)$
Gesamtfehler	$$RSS = \sum_{i=0}^{N-1} (f(x_i) - y_i)^2$$

4.4. LINEARER ANSATZ MIT BASISFUNKTIONEN

TODO:
what

Begriff	***Bedeutung***
Modellfunktion	
Basisfunktion	
Regressionskoeffizient	
Unkorrelierte Stichprobenvarianz	
Unkorrelierte Stichprobenkovarianz	

4.5. LINEARE REGRESSION

TODO:
Examples (19.03.26), shorten

Ziel: Finde eine besonders einfache Funktion, die eine Wertetabelle gut interpoliert.
Gegeben: Wertetabelle, Beschreibung der besonders einfachen Funktionen
Gesucht: Diejenige Funktion, die die Wertetabelle «am besten» wiedergibt. «Am besten» ≠ exakt!
Zentral ist, dass die Ergebnisfunktionen eine einfache Struktur aufweist.
Genauer: Die Ergebnisfunktion muss eine **Linearkombinationen** (=gewichtete Summe) von **wählbaren Basisfunktionen** $b_1(x)...b_n(x)$ d.h. von der Form $f(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot b_k(x)$ sein.
Die Gewichte λ_k heissen **Regressionskoeffizienten**
Alternativ (Vereinfacht): Gesucht sind die Zahlen $\lambda_1...\lambda_n$, für die $f(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot b_k(x)$ die Einträge der Wertetabelle am genauesten wiedergibt = den RSS minimiert

$$\sum_{i=1}^{\#\text{ Messwerte}} \left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot b_k(x_i) - y_i \right)^2$$

$$\rightarrow \lambda \text{ sind die Unbekannten}$$

Gegeben:
1) Wertetabelle

x	x_0	x_1	x_2	...	x_{N-1}
y	y_0	y_1	y_2	...	y_{N-1}

2) Geeignete Funktionen $b_0(x), ..., b_{m-1}(x)$

Aufgabe: Bestimme die besten Regressionsparameter der Modellfunktion

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \underbrace{\lambda_k}_{\text{gesucht}} \; b_k(x)$$

Methode: Bestimme das globale Minimum des von λ_k abhängigen quadratischen Fehlers

$$RSS = \sum_{i=0}^{N-1} (f(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k b_k(x_i) - y_i \right)^2$$

Beispiel: «Ausgleichsgerade»:

Modellfunktionen	***Basisfunktionen***	***Regressionskoeffizienten***
$f(x) = m \cdot x + b$	$b_0(x) = x$ $b_1(x) = 1$	$RSS(b, m) = \sum_{i=0}^{N-1} (m \cdot x_i + b - y_i)^2$

Ziel: Minimiere RSS

Stationäre Stellen von $RSS = RSS(m, b)$

$$\frac{\mathrm{d}RSS}{\mathrm{d}b} = \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i) = 2 \cdot \left(\left(\sum_{i=0}^{N-1} mx_i\right) + \left(\sum_{i=0}^{N-1} b\right) - \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i\right)\right) \overset{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) m + N \cdot b = \sum_{i=0}^{N-1} y_i \qquad \Big| \div N$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Werte}} m + b = \underbrace{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} y_i}_{\text{Mittelwert aller } y\text{-Werte}}$$

$$\Leftrightarrow \overline{x} \cdot m + b = \overline{y}$$

$$\frac{\mathrm{d}RSS}{\mathrm{d}m} = \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i)x_i = 2\left(\left(\sum_{i=0}^{N-1} mx_i^2\right) + \left(\sum_{i=0}^{N-1} bx_i\right) - \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right)\right) \overset{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right) m + \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right) \qquad \Big| \div N$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Quadrate}} m + \left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right)}_{\text{Mittelwert der } x\text{-}y\text{-Produkte}}$$

$$\Leftrightarrow \overline{x^2} \cdot m + \overline{x} \cdot b = \overline{x \cdot y}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} \overline{x} & 1 & \overline{y} \\ \underbrace{\overline{x^2}}_{m} & \underbrace{\overline{x}}_{b} & \overline{x \cdot y} \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} \overline{x} & 1 & \overline{y} \\ \underbrace{\overline{x^2} - \overline{x}^2}_{\text{Varianz var}(x)} & 0 & \underbrace{\overline{x \cdot y} - \overline{x} \cdot \overline{y}}_{\text{var}(x \cdot y)} \end{array}\right) \Bigg\} \Rightarrow \begin{cases} b = \overline{y} - \overline{x} \cdot m \\ m = \frac{\text{var}(x,y)}{\text{var}(x)} \end{cases}$$