

a
BRCA (n=1208)
COAD (n=499)
KIRC (n=605)
LIHC (n=421)
LUAD (n=575)
LUSC (n=551)
PRAD (n=549)
THCA (n=564)
limma
pylimma
up
ns
dn
% of limma row
b
NES difference from limma
NES from limma statistics (Hallmark, 8 cohorts)
limma, other fgsea seed
pylimma, same seed
max |Δ|
pylimma 1e-08
other seed 0.14
c
cumulative fraction of genes
log10 |pylimma − limma| / |limma| (per gene, 8 cohorts)
AveExpr (max 6e-13)
voom weights (gene mean) (max 1e-06)
residual SD (max 6e-07)
logFC (max 1e-05)
P (eBayes) (max 2e-04)
B-statistic (max 7e-06)
P (treat) (max 1e-04)
d
wall time, 1 thread (s)
limma 3.68.5 (R)
pylimma
BRCA (1208)
COAD (499)
KIRC (605)
LIHC (421)
LUAD (575)
LUSC (551)
PRAD (549)
THCA (564)
e
log10 max rel. difference of P
eBayes moderated t
treat (lfc = 1)
3 vs 3
5 vs 5
10 vs 10
TCGA-LUAD, normal vs tumour (20 draws each)