

②

分子標的治療薬:薬剤師の実践ポイント

相互作用管理とモニタリングのコツ

1 服薬指導で伝えるポイント



高血圧・蛋白尿の自覚症状(むくみ、頭痛)を伝え、家庭血圧測定を提案する



手足の皮膚症状の予防的スキンケアを治療開始前から指導する



息切れ・空咳が続く場合は間質性肺疾患の可能性があるので早期受診を伝える

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ CYP3A4を阻害・誘導する薬剤(アゾール系抗真菌薬、リファンピシン等)との併用を確認する
- ☐ 手術予定がある場合、血管新生阻害薬の休薬期間が確保されているか確認する
- ☐ HER2阻害薬使用者の心エコー評価スケジュールが守られているか確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



血圧手帳等を活用し、家庭血圧の推移を診察時に共有する



呼吸器症状が出た場合、間質性肺疾患を念頭に置いた早期の画像検査につなげる

4 実践チェックリスト

- ☐ 新規TKI処方時は相互作用チェックを必ず実施する
- ☐ 心機能・血圧・呼吸器症状など、標的分子に応じたモニタリング項目を確認する
- ☐ 患者さんの自己判断による休薬・減量がないか、服薬状況を確認する

分子標的薬は「どの分子を狙っているか」で注意すべき臓器が決まる。処方薬の標的を意識したモニタリングが鍵。