

3

末梢神経症状:薬剤師の実践ポイント

早期聴取と生活指導のポイント

1 服薬指導で伝えるポイント



「しびれ」は我慢せず、次回受診時に必ず伝えるよう説明する



オキサリプラチン使用中は冷たい飲食物・冷気に触れることを避けるよう具体的に伝える



転倒予防のため、履物や自宅の段差など生活環境の見直しを提案する

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ Grade2以上のしびれが続く場合、減量・休薬の検討状況を処方医に確認する
- ☐ デュロキシセチン等、CIPN治療薬が適応外使用されている場合は根拠・用量を確認する
- ☐ ビンカルカロイド系使用患者で便秘薬が併用されているか確認する(麻痺性イレウス予防)

3 施設間連携・情報共有のポイント



症状の程度(範囲・生活への支障)を薬歴に記録し、診察時に医師へ共有する



症状が残存する場合、リハビリ・整形外科等への紹介状況を確認する

4 実践チェックリスト

- ☐ 毎回の来局時に、しびれの範囲・強さ・生活への支障を具体的に聴取する
- ☐ 症状悪化時は自己判断で治療を続けず、次回受診を待たず連絡するよう伝える
- ☐ 治療終了後も、症状の残存がないか経過観察を続ける

CIPNは自覚症状が主体で見逃されやすい。毎回同じ質問を繰り返し聴取することが早期発見の鍵。