

⑥

作用機序のまとめ(後編)

分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬

1 薬剤の分類マップ

チロシンキナーゼ阻害薬

受容体・細胞内キナーゼ

EGFR・ALK・HER2

オシメルチニブ

アレクチニブ

ラパチニブ

BCR-ABL・BTK

イマチニブ

ダサチニブ

イブルチニブ

VEGFRなど

レンパチニブ

レゴラフェニブ

その他の小分子薬

細胞周期・DNA修復など

細胞周期・DNA修復

バルボシクリブ

アベマシクリブ

オラパリブ

その他

エベロリムス

ベネトクラクス

レナリドミド

抗体薬・ADC

細胞表面の抗原

抗体薬

トラスツズマブ

セツキシマブ

ペバシズマブ

リツキシマブ

ADC・二重特異性抗体

T-DXd

T-DM1

エブコリタマブ

免疫チェックポイント阻害薬

PD-1/PD-L1・CTLA-4

抗PD-1/PD-L1抗体

ニボルマブ

ペムプロリズマブ

アテゾリズマブ

抗CTLA-4抗体

イビリムマブ

トレメリムマブ

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 作用機序から副作用を予測する

EGFRの阻害

起こりやすい副作用 ゼ瘡様皮疹・爪囲炎・下痢
なぜ起こるか 皮膚や腸の細胞もEGFRを使う

薬局で確認すること
保湿・外用薬、排便回数

VEGF経路の阻害

起こりやすい副作用 高血圧・蛋白尿・出血
なぜ起こるか 正常な血管や腎臓もVEGFを使う

薬局で確認すること
家庭血圧、処方箋の尿蛋白

CDK4/6の阻害

起こりやすい副作用 好中球減少・下痢
なぜ起こるか 骨髄の細胞も細胞周期を回している

薬局で確認すること
服用日と休薬日、発熱・下痢

HER2の阻害

起こりやすい副作用 心機能低下
なぜ起こるか 心筋もHER2で守られている

薬局で確認すること
息切れ・むくみ、心エコーの予定

ADC(デルクステカン系など)

起こりやすい副作用 間質性肺疾患・悪心
なぜ起こるか 搭載した抗がん薬の作用

薬局で確認すること
咳・息切れ・発熱


免疫のブレーキ解除(ICI)

起こりやすい副作用 irAE(全身の臓器)
なぜ起こるか 正常な組織にも免疫反応が起こる

薬局で確認すること
だるさ・下痢・口渇など、終了後も

3 副作用の特徴と発現時期

- インフュージョンリアクション(抗体薬)
- 高血圧(VEGF経路阻害薬)
- 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)
- 好中球減少(CDK4/6阻害薬)
- 間質性肺疾患(EGFR阻害薬・ADC)
- irAE(ICI)
- 心機能低下(抗HER2療法)



☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 分子標的薬は、細胞の中のスイッチを止める小分子薬と、細胞の外の目印に結合する抗体薬に分けて整理する
2. 正常な組織の同じ分子が止まることで副作用が起こる。標的から副作用と時期を予測して聞き取る
3. 免疫チェックポイント阻害薬は免疫のブレーキを外す薬。irAEは治療終了後も起こる