

分子標的薬と免疫の薬 — お薬の効き方

お薬の仕組みを知ると、副作用への備え方がわかります

分子標的薬は、がん細胞が増えるための仕組みを狙って止めるお薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、体の免疫ががんを攻撃できるようにするお薬です。効き方によって、気をつける症状が違います。

1 お薬の種類と効き方

がんの「目印」や「増えるための仕組み」を狙うお薬と、免疫の力を使うお薬があります。

飲み薬の分子標的薬(〜チニブなど)

がん細胞が増えるためのスイッチを、細胞の中で止めます。
皮膚の発疹・下痢・血圧の上昇など、お薬ごとに気をつける症状があります。

点滴の抗体薬(〜マブ)

がん細胞の目印にくっついて、増えるのを止めます。
点滴中や当日の寒気・発疹は、すぐに伝えてください。

抗体薬物複合体(ADC)

がん細胞の目印を目指して、抗がん剤を届けます。
咳・息切れ・発熱は、すぐに連絡してください。

免疫チェックポイント阻害薬

体の免疫ががんを攻撃できるよう、ブレーキを外します。
免疫が自分の体に向かうことがあり、治療後も注意が必要です。

ご自身のお薬がどの種類かは、薬剤師にお気軽におたずねください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 咳・息切れ・発熱が続く
- 強い頭痛を伴う血圧の上昇
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 強いだるさ・口の渇き・動悸
- 広がる発疹、手足の痛みで歩きにくい
- 皮膚や白目が黄色い

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 飲み薬は、食事との関係(空腹時・食後)と飲む時間を守りましょう
- 胃薬・サプリ・グレープフルーツは、効き目が変わることがあるため事前にご相談ください
- 保湿などのスキンケアと、家庭での血圧測定を続けましょう
- 免疫の薬は、治療が終わった後も副作用が出ることがあります。いつもと違う症状は連絡を
- 他の病院を受診する時は、この治療を受けていることを伝えましょう
- お薬手帳を、病院と薬局の両方でお見せください