

点滴の抗がん剤とアレルギー反応について

点滴の前後に気をつけること

点滴の抗がん剤や抗体薬では、点滴中やその後に、発熱・寒気・発疹・息苦しさなどの反応が出ることがあります。多くは病院ですぐに対応しますが、帰宅してから起こることもあります。

1 点滴の前後の流れ

点滴の前

前に飲む薬は指示された時間にアレルギー歴を伝える

点滴中

かゆみ・息苦しさ・寒気はすぐに看護師へ

帰宅後～翌日

熱・発疹・だるさは病院へ
息苦しさは救急受診

次の点滴

前回の反応を医師・薬剤師に伝える

反応の多くは点滴中に起こり、病院ですぐに対応します。帰宅後の体調の変化は、薬局の薬剤師にもご相談ください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 息苦しい、ゼーゼーする
- 全身にじんましん、唇やまぶたの腫れ
- めまい、意識がぼんやりする
- 38℃以上の熱、寒気・ふるえ
- 発疹やかゆみが広がる
- 手のふるえ・言葉が出にくい(二重特異性抗体・CAR-Tの方)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 薬や食べ物のアレルギーは、病院と薬局の両方に伝えましょう
- 点滴の前に飲む薬がある場合は、指示された時間に飲みましょう
- パクリタキセルの点滴の日は、アルコールの影響があるため車の運転を控えましょう
- 眠くなる薬を使った日は、車の運転を控えましょう
- 熱が出た時に解熱剤を使ってよいかは、事前に確認しておきましょう
- 点滴の回数を重ねてから出る反応もあります。前回なかった症状も伝えましょう