

抗がん剤治療と血圧・むくみ・血栓について

家庭での血圧測定と、足の腫れに早く気づくために

抗がん剤の種類によって、血圧が上がる、尿に蛋白が出てむくむ、血の固まり(血栓)ができる、といった副作用が出る場合があります。ご自宅で血圧を測り、体の変化に早く気づくことが大切です。

1 家庭血圧の記録表(1週間分)

朝は起きてから1時間以内(トイレの後、朝食と薬の前)、夜は寝る前に、座って1〜2分休んでから測りましょう。

日付	朝の血圧(上/下)	夜の血圧(上/下)	むくみ・体重・メモ
月 日	/	/	
月 日	/	/	
月 日	/	/	
月 日	/	/	
月 日	/	/	
月 日	/	/	
月 日	/	/	

上が160以上または下が100以上の日が続く時、強い頭痛や見え方の異常がある時は、病院へご連絡ください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 片方の足だけが腫れる・痛む・色が変わる
- 急な息切れ・胸の痛み
- 強い頭痛、見え方がおかしい、意識がぼんやりする
- 血圧が上160以上または下100以上の日が続く
- 鼻血・歯ぐきの出血が止まらない、黒い便が出る
- 急にむくみや体重が増えた

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 毎日、朝と夜に血圧を測り、記録表に書きましょう
- 塩分は控えめにしましょう
- 血圧の薬は、自己判断でやめないでください
- 血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は、市販の痛み止めを使う前にご相談ください
- 長時間同じ姿勢でいることを避け、こまめに足を動かしましょう
- 記録表とお薬手帳を、受診・来局の時に見せてください