

抗がん剤治療と肺・肝臓の副作用について

咳・息切れ・だるさに早く気づくために

抗がん剤の種類によって、肺に炎症が起こる「間質性肺炎」や、肝臓の働きが悪くなる「肝障害」が起こることがあります。頻度は高くありませんが、早く気づいて対応することがとても大切です。

1 息切れ・体調のセルフチェック表

週に1回、できる=○、少しつらい=△、できない・ある=×を記入して、受診・来局時に見せてください。前回と比べることで、変化に早く気づけます。

できるかどうか	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	6週目
階段を1階分、休まずに上れる						
いつもの速さで歩ける						
空咳が出ていない						
37.5℃以上の熱がない						
だるさ・食欲低下がない						
皮膚や白目が黄色くない						

×がついた時、または△が続く時は、次の受診日を待たずに病院へご連絡ください。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 空咳が続く、痰のない咳が増えた
- 階段や坂道で、いつもより息が切れる
- 息苦しさで発熱を伴う
- 皮膚や白目が黄色い
- 尿の色が濃い(紅茶のような色)
- 強いだるさ・食欲低下が続く

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 息切れは「階段を何階まで上れるか」など、毎回同じ物差しで記録しましょう
- パルスオキシメーターをお持ちの方は、毎日同じ時間に測って記録しましょう
- B型肝炎の再活性化を防ぐ飲み薬は、自己判断でやめないでください
- 新しい市販薬・健康食品・漢方薬は、始める前に薬剤師にご相談ください
- たばこは吸わず、お酒は控えめにしましょう
- 血液検査の結果は、お薬手帳と一緒に薬局でもお見せください