

過敏症・インフュージョンリアクション:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 過敏症・IRRの薬薬連携 — 投与の前後をつなぐ

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
1 前投薬の設定と投与速度の管理	アレルギー歴 (薬・食品)	1 内服の前投薬の服用時間を説明
2 アレルギー歴・前回の反応の確認	前回の反応 (症状・Grade)	2 アレルギー歴・副作用歴を把握し病院と共有
3 白金製剤の投与回数と脱感作・薬剤変更の検討	投与回数 (白金製剤)	3 帰宅後～翌日の遅発性の症状を電話で確認
4 アナフィラキシー発生時の院内対応	帰宅後の症状 (電話フォローの結果)	4 パクリタキセル後の運転・飲酒の注意を説明
5 CRS・ICANS(二重特異性抗体・CAR-T)への対応		5 β遮断薬・降圧薬など投与に関わる併用薬を確認

2 投与前・投与後に薬局でできること

投与前	投与当日	帰宅後～翌日
起こりうること 前回の反応の再発 病院での対策 前投薬(抗ヒスタミン薬・ステロイド・解熱鎮痛薬) 薬局で確認すること 内服の前投薬がある場合、指示された時間に服用できているか	起こりうること インフュージョンリアクション・アナフィラキシー 病院での対策 投与速度の調整、モニタリング 薬局で確認すること パクリタキセル後はアルコールの影響があり、運転を控える	起こりうること 遅発性の発熱・皮疹・だるさ 病院での対策 解熱鎮痛薬の頓用 薬局で確認すること 電話で症状を確認し、受診の目安を伝える
白金製剤の回数を重ねた時期	アレルギー歴の共有	
起こりうること 過敏症の増加 病院での対策 脱感作・薬剤の変更の検討 薬局で確認すること 投与回数とアレルギー歴をお薬手帳で把握	起こりうること 他の薬・食品のアレルギー 病院での対策 アレルギー歴の確認 薬局で確認すること 薬局で把握しているアレルギー歴・副作用歴を病院へ	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	パクリタキセル(溶媒にエタノール) アルコール反応	処方薬 ジスルフィラム・シアナミド・プロカルバジン	顔面紅潮・悪心・頭痛など	他院の処方を確認し、病院と共有
確認 添付文書 重要な基本的 注意	リツキシマブ 投与中の一過性の血圧低下	処方薬 降圧薬	血圧低下	投与前の降圧薬の扱いを病院の指示どおりに説明
確認 服薬指導上の 注意	アナフィラキシーの治療 アドレナリンの効果弱まる	処方薬 β遮断薬	アナフィラキシーが重症化しやすい	β遮断薬の服用を病院と共有
確認 服薬指導上の 注意	前投薬(抗ヒスタミン薬) 眠気・集中力の低下	生活習慣 運転・機械の操作	事故のおそれ	投与当日の運転を控えるよう指導

4 服薬指導タイムライン — 投与の前後をつなぐ

① 投与前日・当日朝	② 投与当日の帰宅後	③ 翌日～数日	④ 白金製剤の回数を重ねた時期
“前投薬の飲み薬は、指示された時間に飲みましょう ✓ 薬局で確認 前投薬の服用時間、アレルギー歴、前回の反応 △ ここに注意 前回反応があった場合は病院と共有	“今日の点滴はアルコールを含むので、車の運転は控えてください」(パクリタキセル) ✓ 薬局で確認 帰宅後の体調、息苦しさ・発疹の有無 △ ここに注意 息苦しさ・全身の蕁麻疹は救急受診	“熱や発疹、だるさは出ていませんか ✓ 薬局で確認 電話フォローで遅発性の反応を確認 △ ここに注意 発熱が続く時は病院へ連絡	“回数を重ねるとアレルギーが出やすくなります。かゆみや発疹が出たらすぐ伝えてください ✓ 薬局で確認 お薬手帳で投与回数を把握 △ ここに注意 前回なかった症状も我慢せず伝える