

宛先	病院 科 先生 御机下	保険薬局	名称:
患者氏名	様(歳 □男 □女)	連絡先	TEL: FAX:
生年月日	年 月 日 病院 ID:	担当薬剤師	

1 治療内容と確認の状況

レジメン	レジメン名: コース:第 コース 前回投与日: 月 日
経口抗がん薬	薬剤名: 服用日: 月 日～ 月 日(休薬: 月 日～)
確認日・方法	月 日 □来局時 □電話フォロー □その他() 発熱(37.5℃以上):□なし □あり(最高 ℃、 月 日)

緊急性の高い症状は本書ではなく、病院へ直接電話してください。

例:38℃以上の発熱・悪寒(発熱性好中球減少症の疑い)、水分がとれない・尿が少ない・1日7回以上の下痢、点滴部位の痛み・腫れ(血管外漏出の疑い)

☐ 病院へ電話連絡済み(月 日 時 分、対応者:)

2 副作用の評価(CTCAE v5.0)

有害事象	Grade 1	Grade 2	Grade 3	評価(該当に✓)
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少・脱水・栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する;内科的治療を要する	経管栄養/TPN/入院を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
食欲不振	食生活の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂食量の変化;経口栄養剤を要する	顕著な体重減少または栄養失調を伴う;静脈内輸液/経管栄養/TPNを要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
下痢	ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加	ベースラインと比べて4～6回/日の排便回数増加	7回以上/日の増加;入院を要する;身の回りのADLの制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
便秘	不定期・間欠的な症状;緩下薬・食事の工夫などを不定期に使用	緩下薬・浣腸の定期的使用を要する持続的症状;身の回り以外のADLの制限	排便を要する頑固な便秘;身の回りのADLの制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
口腔粘膜炎	症状がない、または軽度の症状;治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍;食事の変更を要する	高度の疼痛;経口摂取に支障がある	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
末梢性感覚ニューロパシー	症状がない	中等度の症状;身の回り以外のADLの制限	高度の症状;身の回りのADLの制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
手足症候群(経口FU系)	疼痛を伴わないわずかな皮膚の変化(紅斑・浮腫・角質増殖など)	疼痛を伴う皮膚の変化(角層剥離・水疱・亀裂など);身の回り以外のADLの制限	疼痛を伴う高度の皮膚の変化;身の回りのADLの制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
疲労	休息により軽快する疲労	休息によって軽快しない疲労;身の回り以外のADLの制限	休息によって軽快しない疲労で、身の回りのADLの制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上

3 服薬状況・支持療法

服薬状況	経口抗がん薬:□指示どおり □飲み忘れ(回) □自己判断で中断・減量 □休薬日の誤り 残薬: 日分
支持療法薬	制吐薬:□指示どおり □不足/追加使用(回) 止瀉薬:□使用なし □使用(回/日) 緩下薬:□使用なし □使用
併用薬の変更	□なし □あり(他院処方・市販薬・サプリ:)

4 薬剤師の所見・提案

経過・患者さんの訴え:

薬剤師としての提案(該当に✓):
☐制吐薬の見直し ☐止瀉薬・整腸薬 ☐緩下薬 ☐含嗽薬・口腔ケア ☐保湿剤・外用薬 ☐減量・休薬の検討 ☐その他()

☐ 本報告について、患者さんの同意を得ています。

本書は緊急性の低い情報をお伝えするもので、疑義照会ではありません。処方変更の要否はご判断をお願いいたします。

Grade:有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳 JCOG 版(CTCAE v5.0)を薬局での聞き取り用に要約。判定は原文をご参照ください。ADL:身の回り以外=買い物・家事・服薬管理など、身の回り=入浴・着衣・食事・トイレなど。