

宛先	病院 科 先生 御机下	保険薬局	名称:
患者氏名	様(歳 □男 □女)	連絡先	TEL: FAX:
生年月日	年 月 日 病院 ID:	担当薬剤師	

1 治療内容と確認の状況

薬剤	ICI: (併用薬:) 初回投与日: 年 月 日 最終投与日: 月 日
ステロイド	☐ 使用なし ☐ 使用中(薬剤名: 現在 mg/日、漸減の予定: ☐ 守れている ☐ 守れていない) ST 合剤: ☐ あり ☐ なし
確認日・方法	月 日 ☐ 来局時 ☐ 電話フォロー ☐ その他() 体温: °C 体重: kg(前回比 kg)

緊急性の高い症状は本書ではなく、病院へ直接電話してください。

例:動悸・胸痛・息切れ(心筋炎)、まぶたが下がる・物が二重に見える・力が入らない(重症筋無力症・筋炎)、血便・強い腹痛、強い口渇・多尿・意識がぼんやりする(1型糖尿病)、強い倦怠感・低血圧(副腎不全)

☐ 病院へ電話連絡済み(月 日 時 分、対応者:)

2 副作用の評価(CTCAE v5.0)

有害事象	Grade 1	Grade 2	Grade 3	評価(該当に✓)
下痢	ベースラインと比べて<4 回/日の排便回数増加	ベースラインと比べて 4~6 回/日の排便回数増加	7 回以上/日の増加;入院を要する;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
大腸炎	症状がない;臨床所見または検査所見のみ	腹痛;粘液便または血便	高度の腹痛;腹膜刺激症状	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
斑状丘疹状皮疹	体表面積の<10%を占める斑状疹/丘疹	体表面積の 10~30%;身の回り以外の ADL の制限	体表面積の>30%で中等度以上の症状;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
そう痒症	軽度または限局性;局所治療を要する	広範囲かつ間欠性;掻破による皮膚の変化;内服治療を要する;身の回り以外の ADL の制限	広範囲かつ常時;身の回りの ADL の制限・睡眠の妨げ;全身ステロイドを要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
疲労	休息により軽快する疲労	休息によって軽快しない疲労;身の回り以外の ADL の制限	休息によって軽快しない疲労で、身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
甲状腺機能低下症	症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	症状がある;甲状腺ホルモンの補充療法を要する;身の回り以外の ADL の制限	高度の症状;身の回りの ADL の制限;入院を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
高血糖	ベースラインからの異常;治療を要さない	糖尿病の日常管理の変更・経口血糖降下薬を要する;糖尿病の精査を要する	インスリン療法を要する;入院を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
肺臓炎	症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	症状がある;内科的治療を要する;身の回り以外の ADL の制限	高度の症状;身の回りの ADL の制限;酸素を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
関節痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛;身の回り以外の ADL の制限	高度の疼痛;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上

3 服薬状況・支持療法

ホルモン補充	☐ なし ☐ あり(□甲状腺ホルモン □ヒドロコルチゾン □インスリン):□指示どおり □飲み忘れ・自己中断
他科受診・併用薬	他科受診:□なし □あり(科、ICI 治療中と □伝えた □未) 新しい薬:□なし □あり()
非特異的な症状	☐ 倦怠感 ☐ 食欲低下 ☐ 口渇・多尿 ☐ 動悸 ☐ 寒がり・むくみ ☐ 頭痛 ☐ 筋肉痛 ☐ その他()

4 薬剤師の所見・提案

経過・患者さんの訴え:

薬剤師としての提案(該当に✓):
☐甲状腺・血糖などの検査の検討 ☐止瀉薬使用の可否 ☐外用薬・抗ヒスタミン薬 ☐ステロイド関連(ST 合剤・胃薬・血糖) ☐専門科受診の検討 ☐その他()

☐ 本報告について、患者さんの同意を得ています。