

宛先	病院 科 先生 御机下	保険薬局	名称:
患者氏名	様(歳 □男 □女)	連絡先	TEL: FAX:
生年月日	年 月 日 病院 ID:	担当薬剤師	

1 治療内容と確認の状況

薬剤	薬剤名:	用量:	mg × 回/日	開始日:	年 月 日(現在の減量段階:)
検査値	処方箋・検査結果より:AST	ALT	総ビリルビン	尿蛋白	その他: (月 日)
確認日・方法	月 日 □来局時 □電話フォロー □その他()	家庭血圧(平均):	/	mmHg	

緊急性の高い症状は本書ではなく、病院へ直接電話してください。

例:咳・息切れ・発熱(間質性肺炎患の疑い)、皮膚や白目が黄色い・強い倦怠感(肝障害)、水疱・粘膜疹を伴う発疹、強い頭痛を伴う血圧上昇、片足の腫れ・胸痛

☐ 病院へ電話連絡済み(月 日 時 分、対応者:)

2 副作用の評価(CTCAE v5.0)

有害事象	Grade 1	Grade 2	Grade 3	評価(該当に✓)
ざ瘡様皮疹	体表面積の<10%を占める紅色丘疹/膿疱	体表面積の 10～30%;社会心理学的な影響;身の回り以外の ADL の制限	体表面積の>30%;身の回りの ADL の制限;経口抗菌薬を要する局所の重複感染	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
爪囲炎	爪襞の浮腫や紅斑;角質の剥離	局所的処置・内服治療を要する;疼痛を伴う浮腫や紅斑;身の回り以外の ADL の制限	外科的処置や抗菌薬の静脈内投与を要する;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
手足症候群	疼痛を伴わないわずかな皮膚の変化(紅斑・浮腫・角質増殖など)	疼痛を伴う皮膚の変化(角層剥離・水疱・亀裂など);身の回り以外の ADL の制限	疼痛を伴う高度の皮膚の変化;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
下痢	ベースラインと比べて<4 回/日の排便回数増加	ベースラインと比べて 4～6 回/日の排便回数増加	7 回以上/日の増加;入院を要する;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
口腔粘膜炎	症状がない、または軽度の症状;治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍;食事の変更を要する	高度の疼痛;経口摂取に支障がある	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
高血圧	収縮期 120～139 または拡張期 80～89mmHg	収縮期 140～159 または拡張期 90～99mmHg;内科的治療を要する	収縮期 ≧160 または拡張期 ≧100mmHg;2 種類以上の薬物治療を要する	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
蛋白尿	1+;尿蛋白 ≧基準値上限～<1.0g/24 時間	2+～3+;尿蛋白 1.0～<3.5g/24 時間	尿蛋白 ≧3.5g/24 時間;4+	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
AST/ALT 増加(基準値正常時)	>基準値上限～3.0×基準値上限	>3.0～5.0×基準値上限	>5.0～20.0×基準値上限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上
呼吸困難	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ;身の回り以外の ADL の制限	安静時の息切れ;身の回りの ADL の制限	☐ なし ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 以上

3 服薬状況・支持療法

服薬状況	☐ 指示どおり ☐ 飲み忘れ(回) ☐ 自己判断で中断・減量 ☐ 服用時点の誤り(空腹時/食後) 残薬: 日分
スキンケア・外用薬	保湿剤: ☐ 毎日使用 ☐ 不十分 外用ステロイド: ☐ 指示どおり ☐ 未使用・不足 予防内服: ☐ 服用中 ☐ 未服用
併用薬の変更	☐ なし ☐ あり(胃酸分泌抑制薬・CYP3A 関連薬・サプリ・グレープフルーツ等:)

4 薬剤師の所見・提案

経過・患者さんの訴え:

薬剤師としての提案(該当に✓):

☐外用ステロイドのランク調整 ☐保湿剤の追加・増量 ☐止瀉薬 ☐降圧薬の調整 ☐皮膚科受診の検討 ☐減量・休薬の検討 ☐その他()

☐ 本報告について、患者さんの同意を得ています。