

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
DNA合成・細胞分裂を障害

フッ化ピリミジン系 **S-1** **カペシタビン** 5-FU **FTD/TPI** 白金製剤 オキサリプラチン シスプラチン
タキサン系・その他 バクリタキセル nab-バクリタキセル ドセタキセル イリノテカン

抗HER2療法
HER2陽性(約20%)に使用

抗HER2抗体 **トラスツマブ** 抗体薬物複合体(ADC) **T-DXd**

血管新生阻害・新規標的
VEGFR-2・Claudin18.2を標的

抗VEGFR-2抗体 **ラムシルマブ** 抗Claudin18.2抗体 **ゾルベツキシマブ**

免疫チェックポイント阻害薬
PD-L1陽性・MSI-Highなどに使用

抗PD-1抗体 **ニボルマブ** **ペムブロリズマブ**

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬


2 治療ラインの位置づけ(切除不能進行・再発)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
HER2陽性	● フッ化ピリミジン系+白金製剤+トラスツマブ	● ラムシルマブ+バクリタキセル ● T-DXd	● ニボルマブ ● FTD/TPI ● イリノテカン 等
HER2陰性 CLDN18.2陽性	● フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ゾルベツキシマブ	● ラムシルマブ+バクリタキセル	● ニボルマブ ● FTD/TPI ● イリノテカン 等
HER2陰性 PD-L1陽性 等	● フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ニボルマブ(またはペムブロリズマブ)	● ラムシルマブ+バクリタキセル	● FTD/TPI ● イリノテカン 等

● 細胞障害性抗がん薬中心 ● 分子標的薬(注射)を含む ● 経口薬を含む ● 免疫チェックポイント阻害薬

CLDN18.2とPD-L1がともに陽性の場合の選択は個別に判断。MSI-High例ではペムブロリズマブも選択肢。切除後の術後補助化学療法はS-1(1年)、ドセタキセル+S-1、CAPOX等。

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

1. 胃癌はHER2・CLDN18.2・PD-L1で1次治療が決まり、2次治療はラムシルマブ+バクリタキセルが軸
2. S-1は3成分の配合剤。腎機能での用量調整、休業日の管理、フッ化ピリミジン系の重複に注意
3. ゾルベツキシマブの悪心、T-DXdのILDなど新しい薬剤の副作用と、胃切除後の栄養を薬局で支える