

血液がん:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 血液がんの薬薬連携 — 経口薬・HBV再活性化・CAR-T

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 病型・レジメンの監査、HBV検査と予防投与の計画	HBV-DNAの測定予定 (再活性化の予防)	① CML・骨髄腫の経口薬の服用時点(空腹時等)と残薬の管理
② アントラサイクリン累積量・前投薬・腫瘍崩壊症候群対策	病型・投与歴 (CAR-T・二重特異性抗体)	② 抗ウイルス薬・ST合剤・抗血栓薬など予防投与の継続確認
③ CAR-T・二重特異性抗体のCRS/ICANSへの院内対応	予防投与 (抗ウイルス薬・ST合剤)	③ 市販の胃薬・サブリ・グレープフルーツの確認
④ レナリドミド等の適正管理手順(RevMate)の運用	むくみ・血栓の症状 (TKI・レナリドミド)	④ 電話フォローで発熱・むくみ・息切れ・足の腫れを確認
⑤ CAR-T・移植後の予防投与と免疫回復の見通しを伝達		⑤ レナリドミドは適正管理手順に沿って交付(避妊・残薬の返却)

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

R-CHOP 点滴+経口	リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(1日目)+プレドニゾン(1~5日目内服)	3週毎	✓ B型肝炎検査 ✓ プレドニゾンの服用日・高血糖 ✓ ビンクリスチンの便秘 ✓ 心毒性
イマチニブ 経口	400mg 1日1回 食後 連日内服	連日	✓ 浮腫・体重増加 ✓ 筋けいれん ✓ CYP3A4相互作用
ダサチニブ ニロチニブ 経口	ダサチニブ 1日1回/ニロチニブ 1日2回(空腹時:食事の1時間以上前または食後2時間以降)	連日	✓ 胸水(ダサチニブ) ✓ QT延長・高血糖(ニロチニブ) ✓ 胃酸分泌抑制薬の併用
レナリドミド +デキサメタゾン 点滴+経口	レナリドミド 1~21日目内服+デキサメタゾン 週1回(土ダラツムマブ)	4週毎	✓ 適正管理手順(RevMate)・避妊 ✓ 血栓予防薬 ✓ 腎機能で用量調整
ボルテゾミブ 点滴・注射	皮下注 週1~2回(レジメンにより異なる)	3~5週毎	✓ 末梢神経障害 ✓ 帯状疱疹予防(アシクロビル等) ✓ 起立性低血圧

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	レナリドミド・ボマリドミド 催奇形性	既往・疾患 妊娠・妊娠の可能性	胎児への重篤な影響	RevMateの手順と避妊の継続を確認
注意 添付文書 併用注意	ダサチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意 添付文書 用法・用量	ニロチニブ 食事で吸収が増加	生活習慣 食事と一緒に服用	血中濃度↑ → QT延長等	食事の1時間以上前か食後2時間以降に服用
注意 添付文書 併用注意	イマチニブ・ボルテゾミブ等 CYP3A4阻害	処方薬 サブリ・食品 アゾール系抗真菌薬(感染予防)・グレープフルーツ	血中濃度↑ → 副作用↑	抗真菌薬の開始・変更と食品を確認
注意 添付文書 警告	抗CD20抗体 免疫抑制	既往・疾患 HBs抗原陽性・HBc抗体陽性	B型肝炎の再活性化	HBV-DNAのモニタリング予定を確認
確認 服薬指導上の注意	血液がんの治療中 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	感染症の発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導タイムライン — 血液がんの治療に合わせて

① 治療開始前	② 投与当日~1週	③ レナリドミド服用中	④ CMLのTKI長期服用
“B型肝炎の検査結果を確認してください。治療中や治療後にウイルスが再び増えることがあります”	“点滴中や当日の夜に、寒気・発熱・発疹が出ることがあります。我慢せずすぐに伝えてください”	“妊娠を避ける決まりや、飲み残しを返す手順を守りましょう。足の腫れや息切れは連絡を”	“毎日の服用が効果を保つ鍵です。自己判断でやめたり減らしたりせず、まず相談してください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳で病型・レジメン・HBV検査の結果、併用薬(CYP3A4・胃薬)	✓ 薬局で確認 前投薬の服用、CAR-T後の連絡先と治療施設の把握	✓ 薬局で確認 適正管理手順(RevMate)に沿った確認、抗血栓薬の服用	✓ 薬局で確認 服用時点(ニロチニブは空腹時)、残薬、胃薬の併用
△ ここに注意 HBV-DNAの定期測定の予定を確認	△ ここに注意 CAR-T後は発熱・意識の変化で至急連絡、運転は控える	△ ここに注意 片足の腫れ・胸の痛みは血栓症を疑い至急受診	△ ここに注意 中断・減量は必ず処方医と相談