

細胞障害性抗がん薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- 経口抗がん薬・支持療法薬の服用日と残薬の管理
- 他院処方・市販薬・サプリを含めた併用薬の確認
- 服用期間中の電話フォロー(nadir期の発熱・口内炎など)
- 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ
- 家庭での曝露対策(粉砕しない・排泄物の扱い)の説明

病院と共有する情報

レジメン名・投与日
(お薬手帳)

検査値
(好中球数・腎機能など)

副作用のGrade
(トレーシングレポート)

服用状況・残薬
(電話フォローの結果)

病院薬剤師

- レジメン監査・投与量計算(体表面積・腎機能・累積投与量)
- 前投薬・制吐薬・補液など支持療法の確認
- 抗がん薬の調製と曝露対策、血管外漏出への対応
- 外来化学療法室での副作用説明・セルフケア指導
- お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供

2 投与量と臓器機能 — 薬局で確認できること

カルボプラチン

病院で確認する値・上限 目標AUCと腎機能(カルバート式:AUC×(GFR+25))

理由 GFRの推定方法で投与量が大きく変わる

保険薬局での活用
処方箋の検査値でクレアチニンの推移を確認

シスプラチン

病院で確認する値・上限 腎機能(CCr)、補液量、Mg補充
理由 腎障害の予防

保険薬局での活用
尿量・むくみ・水分摂取を聴取、NSAIDsの新規処方方に注意

ドキシソルビン

病院で確認する値・上限 累積投与量 500mg/m²(他のアントラサイクリン系は換算して通算)

理由 超えると心不全のリスクが上昇

保険薬局での活用
治療歴を通算で把握し、息切れ・むくみを聴取

プレオマイシン

病院で確認する値・上限 総投与量 300mg(力価)

理由 総量に依存して肺線維症のリスク

保険薬局での活用
乾性咳嗽・息切れを聴取

メトトレキサート(大量療法)

病院で確認する値・上限 血中濃度、尿pH、ホリナート救

援
理由 排泄遅延で重篤な副作用

保険薬局での活用
退院後のNSAIDs・PPIの新規処方方に注意

イリノテカン

病院で確認する値・上限 UGT1A1*6/*28の遺伝子多型

理由 ホモ・複合ヘテロで減量を検討

保険薬局での活用
結果を薬歴に記録し、下痢・発熱の指導を強化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑→重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	メトトレキサート 腎排泄の遅延	処方薬 市販薬 NSAIDs・PPI・ST合剤(市販の解熱鎮痛薬も)	MTX濃度↑→骨髄抑制・粘膜障害	市販の解熱鎮痛薬の使用も聴取
注意 添付文書 併用注意	イリノテカン CYP3A4阻害	処方薬 アゾール系抗真菌薬	SN-38↑→骨髄抑制・下痢↑	他院の抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注意	細胞障害性・抗がん薬全般 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	発熱性好中球減少症の発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前

“髪は2〜3週目から抜け始めることが多いので、ウィッグや帽子を早めに準備しておくで安心です

✓薬局で確認
お薬手帳でレジメン・投与日を確認、他院処方・市販薬・サプリの有無

△ここに注意
口腔ケア・歯科受診は治療前に済ませておく

② 投与当日〜5日

“吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。2〜5日目の吐き気にも備えましょう

✓薬局で確認
制吐薬の服用状況、水分・食事量(電話フォローで確認)

△ここに注意
水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡

③ 投与後1〜2週

“37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずにすぐ病院へ。手洗い・うがいもこまめに

✓薬局で確認
電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認

△ここに注意
発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

④ 次回来局時

“手足のしびれや口内炎、食事の状況はいかがですか。前回と比べて教えてください

✓薬局で確認
しびれ・口内炎をGradeで記録し、トレーシングレポートで共有

△ここに注意
Grade2以上は処方医へ情報提供