

免疫チェックポイント阻害薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ICI治療中であることの把握と他科処方・市販薬の確認
- 電話フォローで下痢・倦怠感・口渇・動悸を確認
- ステロイド漸減スケジュールの説明と自己中断の防止
- ST合剤・胃薬・血糖などステロイド関連の確認
- 症状をトレーシングレポートで病院へ(終了後も)

病院と共有する情報

ICIの投与歴・併用療法
(お薬手帳)

検査値

(甲状腺・血糖・肝機能)

irAEの症状とGrade
(トレーシングレポート)

ステロイドの服用状況
(電話フォローの結果)

病院薬剤師

- 投与前スクリーニング(甲状腺・血糖・肝機能・既往歴)
- irAE発症時の院内連携(内分泌・消化器・呼吸器・循環器)
- irAE治療(ステロイド・免疫抑制薬)の用量設計
- 投与歴・irAE歴のお薬手帳への記載
- 治療終了後のフォロー体制の案内

2 irAE治療中のステロイド管理

服用方法

内容 高用量から開始し、4〜6週以上かけて漸減

保険薬局での確認

減量スケジュールの理解、自己判断で中止しない

感染予防

内容 高用量・長期ではニューモシスチス肺炎予防(ST合剤)を検討

保険薬局での確認

ST合剤の処方と服用状況

胃粘膜保護

内容 消化性潰瘍のリスクに応じてPPI等を併用

保険薬局での確認

胃薬の処方、NSAIDs併用の有無

血糖

内容 ステロイドによる高血糖(1型糖尿病との区別も)

保険薬局での確認

口渇・多尿の聴取、血糖値

骨

内容 長期使用で骨粗鬆症

保険薬局での確認

骨粗鬆症治療薬の検討状況

不眠・精神症状

内容 朝の服用で不眠を軽減

保険薬局での確認

服用時刻、気分の変化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	高用量ステロイド(irAE治療) 血糖上昇	処方薬 糖尿病治療薬	高血糖(1型糖尿病との区別も)	血糖測定と糖尿病薬の調整を確認
注意 服薬指導上の 注意	高用量ステロイド 粘膜障害の重複	処方薬 市販薬 NSAIDs(市販の鎮痛薬も)	消化性潰瘍・消化管出血	市販の鎮痛薬の使用を聴取、胃薬を確認
注意 添付文書 併用注意	レボチロキシン(甲状腺irAE) 吸収の低下	処方薬 市販薬 サブリ・食品 鉄剤・カルシウム・制酸剤	甲状腺ホルモン補充の効果減弱	服用時間をずらすよう指導
確認 服薬指導上の 注意	irAE治療中の・ステロイド 急な中止	生活習慣 自己判断での減量・中止	irAEの再燃・副腎不全	指示とおりの漸減を確認
確認 服薬指導上の 注意	ICI 症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め・かぜ薬	irAEの発見の遅れ	自己判断で使わず、まず連絡するよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前

“免疫の薬は、皮膚・お腹・ホルモンなど体のあらゆるところに副作用が出ることがあります。いつもと違う症状は遠慮なく教えてください”

✓ 薬局で確認
お薬手帳でICIの投与歴、自己免疫疾患・間質性肺疾患の既往

△ ここに注意
他科受診時もICI治療中であることを伝えるよう指導

② 開始〜1か月

“動悸や胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないといった症状は、すぐに連絡してください”

✓ 薬局で確認
電話フォローで心筋炎・筋炎の初期症状、皮疹を確認

△ ここに注意
動悸・胸痛・筋力低下は至急受診

③ 1〜6か月

“下痢が続く、だるい、のどが渇いて尿が多い時は、市販薬で様子を見ずに連絡を”

✓ 薬局で確認
下痢の回数、倦怠感・口渇・多尿、咳・息切れ

△ ここに注意
下痢・血便は市販の下痢止めで様子を見ない

④ ステロイド・終了後

“ステロイドは自己判断で急にやめると危険です。減らし方のスケジュールを一緒に確認しましょう”

✓ 薬局で確認
ステロイドの漸減スケジュール、ST合剤・胃薬、血糖

△ ここに注意
治療終了後も症状があれば連絡(遅発性irAE)