

1 薬剤の分類マップ

B細胞性リンパ腫 CD20などB細胞を標的	抗CD20抗体 リツキシマブ オビヌツズマブ
	多剤併用(R-CHOP等) シクロホスファミド ドキソルビシン ピンクリスチン プレドニゾン
慢性骨髄性白血病 BCR-ABLを阻害	ADC ポラツズマブ ベドチン
	第1世代 イマチニブ 第2世代 ダサチニブ ニロチニブ ボスチニブ 第3世代・新規機序 ポナチニブ アシミニブ
多発性骨髄腫 骨髄腫細胞の生存を阻害	プロテアソーム阻害薬 ボルテゾミブ カルフィルゾミブ イキサゾミブ
	免疫調節薬(IMiDs) レナリドミド ポマリドミド サリドマイド 抗体薬 ダラツムマブ イサツキシマブ
細胞療法・二重特異性抗体 T細胞でがんを攻撃	CAR-T細胞療法 CD19標的(リンパ腫) BCMA標的(骨髄腫)
	二重特異性抗体 エブコリタマブ エルラナタマブ テクリスタマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い)
 ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(代表的な3疾患)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	R-CHOP、またはPola-R-CHP	救済化学療法→自家移植、CAR-T細胞療法	CAR-T、二重特異性抗体、ポラツズマブ+BR等
慢性骨髄性白血病慢性期	イマチニブ、ダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブ	他のTKIへ変更(耐性変異・副作用に応じて選択)	ポナチニブ(T315I変異)、アシミニブ
多発性骨髄腫移植非適応	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン(DRd)等	カルフィルゾミブ・ポマリドミド・抗体薬の組み合わせ	二重特異性抗体、CAR-T等

移植適応の多発性骨髄腫は、導入療法(ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン±ダラツムマブ)→自家造血幹細胞移植→レナリドミド維持療法が基本。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● インフュージョンリアクション	● 初回投与中～24時間					
● 腫瘍崩壊症候群	● 治療開始～数日					
● CRS・ICANS(CAR-T等)	● 投与後数日～2週					
● 好中球減少(nadir)		● 7～14日目				
● 便秘・末梢神経障害			● 数週～累積で増強			
● 帯状疱疹(ボルテゾミブ)			● 治療期間中(予防投与を継続)			
● 胸水(ダサチニブ)				● 数か月～年単位でも		
● B型肝炎再活性化					● 治療中～終了後1年以上	

☐ 重篤・特に注意
 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 病型ごとに治療体系が異なる:リンパ腫=抗CD20抗体、CML=BCR-ABL阻害薬、骨髄腫=多剤併用
2. B型肝炎再活性化・催奇形性管理・CRS/ICANSなど、固形がんとは異なる重点管理項目がある
3. 年単位の経口薬と予防投与の継続確認は、保険薬局の薬剤師が担う重要な役割