

免疫チェックポイント阻害薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ ICI治療中であることの把握と他科処方・市販薬の確認
- ☐ 電話フォローで下痢・倦怠感・口渇・動悸を確認
- ☐ ステロイド漸減スケジュールの説明と自己中断の防止
- ☐ ST合剤・胃薬・血糖などステロイド関連の確認
- ☐ 症状をトレーシングレポートで病院へ(終了後も)

病院薬剤師

- ☐ 投与前スクリーニング(甲状腺・血糖・肝機能・既往歴)
- ☐ irAE発症時の院内連携(内分泌・消化器・呼吸器・循環器)
- ☐ irAE治療(ステロイド・免疫抑制薬)の用量設計
- ☐ 投与歴・irAE歴のお薬手帳への記載
- ☐ 治療終了後のフォロー体制の案内

病院と共有する情報

ICIの投与歴・併用療法

検査値

irAEの症状とGrade

ステロイドの服用状況

2 irAE治療中のステロイド管理

項目	内容	保険薬局での確認
服用方法	高用量から開始し、4～6週以上かけて漸減	減量スケジュールの理解、自己判断で中止しない
感染予防	高用量・長期ではニューモシスチス肺炎予防(ST合剤)を検討	ST合剤の処方と服用状況
胃粘膜保護	消化性潰瘍のリスクに応じてPPI等を併用	胃薬の処方、NSAIDs併用の有無
血糖	ステロイドによる高血糖(1型糖尿病との区別も)	口渇・多尿の聴取、血糖値
骨	長期使用で骨粗鬆症	骨粗鬆症治療薬の検討状況
不眠・精神症状	朝の服用で不眠を軽減	服用時刻、気分の変化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意	ICI 免疫反応の抑制	処方薬 ステロイド・免疫抑制薬(他院処方の全身投与)	ICIの効果減弱の可能性	他院でのステロイド処方の有無を確認
注意	ICI 免疫反応の増強	既往・疾患 自己免疫疾患の既往(関節リウマチ等)	既往の増悪・irAE	既往歴と他院での治療状況を確認
注意	ICI 肺の炎症の増強	既往・疾患 間質性肺疾患の既往	肺臓炎のリスク↑	咳・息切れを来局ごとに聴取
注意	高用量ステロイド(irAE治療) 血糖上昇	処方薬 糖尿病治療薬	高血糖(1型糖尿病との区別も)	血糖測定と糖尿病薬の調整を確認
注意	高用量ステロイド 粘膜障害の重複	処方薬 市販薬 NSAIDs(市販の鎮痛薬も)	消化性潰瘍・消化管出血	市販の鎮痛薬の使用を聴取、胃薬を確認
確認	ICI 症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め・かぜ薬	irAEの発見の遅れ	自己判断で使わず、まず連絡するよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「免疫の薬は、皮膚・お腹・ホルモンなど体のあらゆるところに副作用が出ることがあります。いつもと違う症状は遠慮なく教えてください」

確認:お薬手帳でICIの投与歴、自己免疫疾患・間質性肺疾患の既往

△ 他科受診時もICI治療中であることを伝えるよう指導

開始～1か月

「動悸や胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないといった症状は、すぐに連絡してください」

確認:電話フォローで心筋炎・筋炎の初期症状、皮疹を確認

△ 動悸・胸痛・筋力低下は至急受診

1～6か月

「下痢が続く、だるい、のどが渇いて尿が多い時は、市販薬で様子を見ずに連絡を」

確認:下痢の回数、倦怠感・口渇・多尿、咳・息切れ

△ 下痢・血便は市販の下痢止めで様子を見ない

ステロイド・終了後

「ステロイドは自己判断で急にやめると危険です。減らし方のスケジュールと一緒に確認しましょう」

確認:ステロイドの漸減スケジュール、ST合剤・胃薬、血糖

△ 治療終了後も症状があれば連絡(遅発性irAE)