

大腸がんの抗がん剤治療を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

大腸がんの治療では、点滴と飲み薬を組み合わせることが多く、お薬によって出やすい症状や時期が違います。症状の多くは、早めに対処すれば軽くすむことができます。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 時期ごとに気をつけること

点滴の日～数日

- ・冷たい物に触れたり飲んだりすると、手足やのどがしびれることがあります
- ・吐き気や下痢が出る場合があります

1～2週目ごろ

- ・体を守る白血球が最も減る時期です
- ・熱や寒気、のどの痛みに注意しましょう

数週間～

- ・手足の赤み・痛み、ニキビのような発疹が出る場合があります
- ・手足のしびれが続くこともあります

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・ 37.5℃以上の熱や寒気がある
- ・ 水のような下痢が1日4回以上続く、下痢止めを飲んでも止まらない
- ・ 食事や水分が1日以上とれない
- ・ 便に血が混じる、強いおなかの痛みがある
- ・ 手足の痛みや水ぶくれで歩けない、物が持てない
- ・ 息苦しさ、じんましん、顔のむくみ(点滴中や点滴の後)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・ 飲み薬は決められた日・時間に飲みます(多くは食後)。飲み忘れても、2回分を一度に飲まないでください
- ・ オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、外出時は手袋を。冷蔵庫の物は手袋を使って取り出しましょう
- ・ 保湿剤は1日2回以上、手足にたっぷり塗りましょう。きつい靴や長時間の歩行は避けます
- ・ 携帯型ポンプを付けている間は、ポンプを濡らさず、管が折れたり引っ張られたりしないように気をつけます
- ・ 市販の薬・サプリメント・健康食品を使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- ・ 体温と排便の回数を、毎日メモしておくとう診時に役立ちます