

胃がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

胃がんの治療では、S-1などの飲み薬と点滴の抗がん剤、分子標的薬や免疫のお薬を組み合わせます。お薬によって出やすい症状や時期が異なるため、気になることがあれば早めにご相談ください。

1 時期ごとに気をつけること

治療の日～数日

- ・吐き気や食欲の低下が出ることがあります
- ・冷たい物で手足やのどがしびれることがあります

1～2週目ごろ

- ・白血球が減り、感染しやすくなります
- ・口内炎や下痢が出ることがあります

数週間～

- ・手足の赤み・黒ずみ、涙が多くなる、しびれが続くことがあります

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・ 37.5℃以上の熱や寒気がある
- ・ 食事や水分が1日以上とれない
- ・ 水のような下痢が1日4回以上続く
- ・ 便が黒い、血を吐いた、強いおなかの痛み
- ・ 咳・息切れ・発熱が続く
- ・ 手足の痛みや水ぶくれで歩けない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・ S-1などの飲み薬は、飲む日と休む日を守りましょう。飲み忘れても2回分を一度に飲まないでください
- ・ 他の病院で抗がん剤の飲み薬が出た時は、必ず薬剤師に伝えてください(一緒に飲むと危険な組み合わせがあります)
- ・ 胃の手術を受けた方は、少ない量を回数を分けて食べましょう
- ・ やわらかい歯ブラシとうがいで、口の中を清潔に保ちましょう
- ・ オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、手袋を使いましょう
- ・ 市販の薬・サプリメントを使う時は、事前にご相談ください