

血液がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

血液がんの治療では、抗体薬や飲み薬、点滴の抗がん剤などを組み合わせます。免疫が下がった状態が長く続くことがあるため、感染を防ぐ工夫と、早めの連絡がとても大切です。

1 時期ごとに気をつけること

治療の日～数日

- 点滴中に熱・寒気・発疹が出る場合があります
- 水分をしっかりとりましょう

1～3週目ごろ

- 白血球や血小板が減る時期です
- 熱や出血に注意しましょう

数か月～

- 免疫が低い状態が長く続く場合があります
- 定期的な血液検査で肝炎なども確認します

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- あざが増える、鼻血や歯ぐきの出血が止まらない
- 咳・息切れが続く
- ピリピリした痛みと水ぶくれ(带状疱疹の可能性)
- 皮膚や白目が黄色い、強いだるさがある
- 片方の足の腫れや痛み、急な胸の痛み

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 手洗い・うがい・マスクで感染を防ぎ、予防のお薬は指示どおり飲み続けましょう
- 体温を毎日同じ時間に測って記録しましょう
- 飲み薬は、飲む日と休む日を守りましょう
- レナリドミドなどを使う方は、妊娠を避ける決まりを守り、お薬をご家族が触れないように保管しましょう
- 他の病院を受診する時や輸血を受ける時は、この治療中であることを伝えましょう
- 市販の薬・サプリメント・グレープフルーツは、事前にご相談ください