

肺がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

肺がんの治療では、飲み薬(分子標的薬)、点滴の抗がん剤、免疫の働きを利用するお薬などが使われ、お薬によって出やすい症状が違います。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 時期ごとに気をつけること

開始～2週

- ・飲み薬では下痢や発疹が出ることがあります
- ・点滴では吐き気やだるさが出ることがあります

1～2週目ごろ

- ・点滴の抗がん剤では白血球が減り、感染しやすくなります

数週間～

- ・爪のまわりの腫れ、皮膚の乾燥が出ることがあります
- ・免疫のお薬では、数か月後に副作用が出ることもあります

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・咳・息切れ・発熱が続く、急に息苦しくなった
- ・37.5℃以上の熱や寒気がある
- ・水のような下痢が1日4回以上続く
- ・動悸、めまい、脈が乱れる
- ・皮膚や白目が黄色い、強いだるさがある
- ・発疹が全身に広がる、水ぶくれができる

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・飲み薬は決められた時間に飲みましょう(空腹時・食後など、お薬ごとに違います)
- ・飲み忘れても、2回分を一度に飲まないでください
- ・市販の胃薬・サプリメント・グレープフルーツは、効き目が変わることがあるため事前にご相談ください
- ・保湿とスキンケアを続け、爪は短く切りすぎないようにしましょう
- ・禁煙を続けましょう(喫煙で効き目が弱まるお薬もあります)
- ・咳や息切れの変化をメモしておき、受診時に伝えましょう