

はじめて抗がん剤治療を受ける方へ

治療中に起こりやすいことと、毎日の過ごし方

抗がん剤の治療では、お薬の種類によって出やすい症状や時期が違います。多くの症状は、早めに気づいて対処すれば軽くすむことができます。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 時期ごとに気をつけること

治療の日～数日

- 吐き気や食欲の低下、だるさが出ることがあります
- 点滴の場合、発疹や息苦しさなどのアレルギー反応が出ることがあります

1～2週目ごろ

- 体を守る白血球が減り、感染しやすくなります
- 口内炎や下痢が出ることがあります

数週間～

- 脱毛、手足のしびれ、皮膚の乾燥などが出ることがあります(お薬によって違います)

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 咳や息切れが続く、急に息苦しくなった
- 吐き気で食事や水分が1日以上とれない
- 発疹が全身に広がる、目や口の中がただれる
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 強いだるさで起き上がれない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 治療のスケジュールと、飲み薬の飲み方・休む日をカレンダーで確認しましょう
- 手洗い・うがいを習慣にし、人混みではマスクをしましょう
- 体温を毎日同じ時間に測り、メモしておきましょう
- やわらかい歯ブラシで口の中を清潔に保ちましょう
- 市販の薬・サプリメント・健康食品を使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- お薬手帳は、病院・薬局・歯科のどこでも必ず見せてください(治療の内容を共有できます)