

免疫チェックポイント阻害薬を使う方へ

免疫の副作用(irAE)を早く見つけるために

このお薬は、体の免疫の力でがんを攻撃します。その免疫が自分の体の臓器に働きすぎると、さまざまな副作用(irAE)が起こることがあります。早く気づいて治療すれば、多くは軽くすむことができます。

1 時期ごとに気をつけること

治療開始～数か月

- ・皮膚のかゆみ・発疹、下痢、だるさが出る場合があります

数週間～数か月

- ・甲状腺・肝臓・肺・腸などに炎症が起こることがあります

治療が終わった後も

- ・治療の終了から数か月後に出ることもあります
- ・他の病院でも、この治療を受けたことを伝えましょう

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・下痢が1日4回以上、便に血が混じる、強い腹痛
- ・咳・息切れ・発熱が続く
- ・強いだるさ、食欲の低下、吐き気が続く
- ・のどが渇く、尿が多い、急に体重が減った
- ・皮膚や白目が黄色い、尿の色が濃い
- ・力が入らない、まぶたが下がる、物が二重に見える、動悸

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・体温・体重・排便の回数を毎日記録しましょう
- ・他の病院や歯科を受診する時は、この治療を受けている(受けた)ことを伝え、お薬手帳や患者カードを見せましょう
- ・副作用の治療でステロイドが出た時は、自己判断で減らしたりやめたりしないでください
- ・市販の薬・サプリメントを使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- ・症状が軽くても、いつもと違うと感じたら早めにご連絡ください