

飲み薬の抗がん剤を安全に使うために

毎日飲むお薬だからこそ知っておきたいこと

飲み薬の抗がん剤は、ご自宅で毎日続けるお薬です。決められた飲み方を守ることと、副作用に早く気づくことが、治療を長く続けるための大切なポイントです。

1 時期ごとに気をつけること

飲み始め～2週

- ・下痢、ニキビのような発疹、血圧の上昇などが出ることがあります(お薬によって違います)

数週間～

- ・手足の皮膚の赤み・痛み、爪のまわりの腫れ、むくみが出ることがあります

治療中ずっと

- ・咳や息切れ(肺の副作用)、だるさ(肝臓の副作用)は、いつ起こるか分かりません

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・咳・息切れ・発熱が続く(肺の副作用の可能性)
- ・皮膚や白目が黄色い、強いだるさがある
- ・水のような下痢が1日4回以上続く
- ・家で測った血圧がいつもよりかなり高く、頭痛がある
- ・手足の痛みや水ぶくれで歩けない・物が持てない
- ・胸の痛み・動悸・急なむくみがある

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・決められた時間(食前・食後など、お薬ごとの指示どおり)に毎日飲みましょう
- ・飲み忘れても2回分を一度に飲まないでください。忘れた時の対応は事前に確認しておきましょう
- ・お薬は割ったり砕いたりせず、ご家族が直接触れないように保管しましょう
- ・グレープフルーツ、セイヨウオトギリソウ(サブリ)、市販の胃薬は、効き目が変わることがあるため事前にご相談ください
- ・家庭で血圧を測り、手帳に記録しましょう
- ・残っているお薬の数を、次の受診・来局時にお知らせください