

抗がん剤治療と胃腸の症状について

吐き気・下痢・口内炎とうまく付き合うために

抗がん剤の治療では、吐き気や下痢、口の中の痛みなどが出ることがあります。多くはお薬や生活の工夫でやわらげることができます。気になることがあれば、いつでもご相談ください。

1 時期ごとに気をつけること

治療の日～5日目

- ・吐き気・食欲の低下(2～5日目に出ることも)
- ・薬によっては治療当日から下痢

1～2週目ごろ

- ・口内炎が出やすい時期です
- ・下痢や便秘が続くこともあります

次の治療の前

- ・治療を思い出して吐き気を感じることもあります。遠慮なくご相談ください

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・食事や水分が1日以上とれない
- ・3日以上便が出ず、おなかが張る・吐く
- ・水のような下痢が1日4回以上続く、下痢止めでも止まらない
- ・口内炎の痛みで食べたり飲み込んだりできない
- ・下痢に熱や腹痛を伴う、便に血が混じる
- ・めまいがする、尿が少ない(脱水のサイン)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・吐き気止めは、吐き気が出てからではなく、指示どおり予防的に飲みましょう
- ・食べられる時に、食べられる物を少しずつ。においの少ない、冷ました食事が食べやすいです
- ・水分はこまめに少しずつとりましょう(経口補水液も役立ちます)
- ・やわらかい歯ブラシで歯をみがき、1日数回うがいをしましょう
- ・市販の下痢止め・便秘薬は、自己判断で使わず、まずご相談ください
- ・排便の回数と体重をメモしておく、受診時に役立ちます