

抗がん剤治療と発熱・感染について

熱が出たときの正しい対応を知っておきましょう

抗がん剤の治療中は、細菌と戦う「白血球」が一時的に少なくなることがあります。この時期に感染すると重症化しやすいため、熱が出た時の対応を前もって知っておくことが大切です。

1 時期ごとに気をつけること

治療後数日

- 白血球を増やす注射の後
は、腰や骨が痛むことがあります

1～2週目ごろ

- 白血球が最も減る時期で
す
- 熱や寒気に特に注意しま
しょう

2～3週目ごろ

- 血小板が減ると、あざや
鼻血が出やすくなります

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱、寒気・ふるえがある
- のどの痛み、咳、尿をする時の痛みがあ
る
- 下痢に熱を伴う
- 鼻血や歯ぐきの出血が止まらない、あざ
が増える
- 息切れ・動悸・ふらつきがある
- ぐったりして水分がとれない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 体温を毎日同じ時間に測って記録しましょう
- 手洗い・うがい、外出時のマスクを心がけ、人混みは避けましょう
- 刺身や生卵などの生ものは控え、加熱した食事を心がけましょう
- 痛み止めやかぜ薬は熱を下げてしまうため、飲む前に必ず体温を測りましょう
- 抗菌薬を渡されている場合は、飲み始める条件と連絡の手順を確認しておきましょう
- 夜間・休日の病院の連絡先を、目につく所に貼っておきましょう