

# 抗がん剤治療と手足のしびれについて

早めに伝えていただきたいこと

一部の抗がん剤では、手足のしびれや痛みが出ることがあります。しびれは早めに伝えていただくことで、お薬の量を調整して悪化を防げることがあります。我慢せずにお知らせください。

## 1 時期ごとに気をつけること

### 点滴の日～数日

- ・オキサリプラチンでは、冷たい物に触れると手足やのど・口のまわりがしびれることがあります

### 治療を重ねるうちに

- ・指先・足先からしびれが始まり、少しずつ広がるがあります

### 治療が終わった後

- ・しばらく強くなることや、長く続くことがあります

## 2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・ボタンがかけにくい、箸が使いにくい、字が書きにくい
- ・便秘が続き、おなかが張る
- ・つまずく、転びやすい、歩きにくい
- ・点滴中・点滴後に息苦しさ・じんましん・顔のむくみ
- ・急に手足に力が入らなくなった
- ・立ちくらみやふらつきが強い

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

## 3 毎日の生活で気をつけること

- ・しびれは我慢せず、どんな動作で困っているかを具体的に伝えましょう
- ・夜に移動する時は明かりをつけ、手すりを使いましょう
- ・感覚が鈍くなるため、お湯の温度は温度計やひじで確かめましょう(やけど予防)
- ・足に合った靴を選び、足の傷や靴ずれを毎日目で見て確認しましょう
- ・オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、手袋・マフラーを使いましょう
- ・しびれや痛みのお薬で眠気やふらつきが出ることがあります。車の運転はご相談ください