

抗がん剤治療と皮膚の症状について

手足の赤み・発疹・爪のトラブルを防ぐために

抗がん剤の種類によって、手足の赤みや痛み、ニキビのような発疹、爪のまわりの腫れなどが出ることがあります。治療を始めた時からのスキンケアで、症状を軽くすることができます。

1 時期ごとに気をつけること

開始～2週

- ・ニキビのような発疹、手足の赤みや痛みが出ることがあります(お薬によって違います)

1～2か月

- ・皮膚の乾燥・かゆみ、爪のまわりの腫れや痛みが出ることがあります

数か月～

- ・手足の皮膚が硬くなる、ひび割れる、色が黒ずむことがあります

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- ・ 熱を伴う発疹が全身に広がる
- ・ 目の充血、唇や口の中のただれ
- ・ 水ぶくれができる、皮膚がむける
- ・ 手足の痛みで歩けない・物が持てない
- ・ 爪のまわりが腫れて膿が出る、痛みが強い
- ・ 発疹やかゆみで眠れない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- ・ 保湿剤は1日2回以上、入浴後すぐにたっぷり塗りましょう(人差し指の先から第1関節までの量で手のひら2枚分)
- ・ 塗り薬は、塗る場所と回数を守って使い、自己判断でやめないでください
- ・ きつい靴、長時間の歩行、熱いお湯は避け、家事の時は手袋を使いましょう
- ・ 直射日光を避け、帽子や日焼け止めを使いましょう
- ・ 洗顔・入浴はぬるま湯で、泡立てた低刺激の石けんでやさしく洗いましょう
- ・ 爪は短く切りすぎず、角を少し残しましょう