

## 1 薬剤の分類マップ

**細胞障害性抗がん薬**  
DNA合成・細胞分裂を障害

フッ化ピリミジン系 **S-1** **カペシタビン** 5-FU **FTD/TPI** 白金製剤 オキサリプラチン シスプラチン  
タキサン系・その他 パクリタキセル nab-パクリタキセル ドセタキセル イリノテカン

**抗HER2療法**

HER2陽性(約20%)に使用

抗HER2抗体 **トラスツマブ** 抗体薬物複合体(ADC) **T-DXd**

**血管新生阻害・新規標的**  
VEGFR-2・Claudin18.2を標的

抗VEGFR-2抗体 **ラムシルマブ** 抗Claudin18.2抗体 **ゾルベツキシマブ**

**免疫チェックポイント阻害薬**

PD-L1陽性・MSI-Highなどに使用

抗PD-1抗体 **ニボルマブ** **ペムブロリズマブ**

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

## 2 治療ラインの位置づけ(切除不能進行・再発)

| 対象                   | 1次治療                                  | 2次治療                 | 3次治療以降                |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| HER2陽性               | フッ化ピリミジン系+白金製剤+トラスツマブ                 | ラムシルマブ+パクリタキセル、T-DXd | ニボルマブ、FTD/TPI、イリノテカン等 |
| HER2陰性<br>CLDN18.2陽性 | フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ゾルベツキシマブ           | ラムシルマブ+パクリタキセル       | ニボルマブ、FTD/TPI、イリノテカン等 |
| HER2陰性<br>PD-L1陽性等   | フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ニボルマブ(またはペムブロリズマブ) | ラムシルマブ+パクリタキセル       | FTD/TPI、イリノテカン等       |

CLDN18.2とPD-L1がともに陽性の場合の選択は個別に判断。MSI-High例ではペムブロリズマブも選択肢。切除後の術後補助化学療法はS-1(1年)、ドセタキセル+S-1、CAPOX等。

## 3 副作用の特徴と発現時期

|                    | 投与日    | 1週         | 2週 | 3週 | 1か月      | 3か月～          |
|--------------------|--------|------------|----|----|----------|---------------|
| ● 悪心・嘔吐(シスプラチン)    | ～5日    |            |    |    |          |               |
| ● 悪心・嘔吐(ゾルベツキシマブ)  | 投与中～当日 |            |    |    |          |               |
| ● 急性神経症状(オキサリプラチン) | 投与中～数日 |            |    |    |          |               |
| ● 好中球減少(nadir)     |        | 7～14日目     |    |    |          |               |
| ● 下痢・口内炎(S-1)      |        | 服用2週目以降に多い |    |    |          |               |
| ● 流涙・色素沈着(S-1)     |        |            |    |    | 数か月の服用で  |               |
| ● 蓄積性末梢神経障害        |        |            |    |    | 累積投与量に依存 |               |
| ● 間質性肺炎患(T-DXd等)   |        |            |    |    |          | 数週～数か月、時期を問わず |

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

### 押さえておきたいポイント

- 胃癌はHER2・CLDN18.2・PD-L1で1次治療が決まり、2次治療はラムシルマブ+パクリタキセルが軸
- S-1は3成分の配合剤。腎機能での用量調整、休薬日の管理、フッ化ピリミジン系の重複に注意
- ゾルベツキシマブの悪心、T-DXdのILDなど新しい薬剤の副作用と、胃切除後の栄養を薬局で支える