


乳がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

乳がんの治療では、ホルモン療法、飲み薬の分子標的薬、点滴の抗がん剤などを組み合わせ、長い期間続けることもあります。気になる症状は我慢せず、病院や薬局にご相談ください。

1 飲み薬のスケジュールの例

乳がんのホルモン療法では、毎日飲むお薬と、飲む日・休む日が決まっているお薬を組み合わせることがあります。



組み合わせるお薬によって飲み方が違います。お渡しするカレンダーで、飲む日と休む日を確認しましょう。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 息切れ・むくみ・動悸がある
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 片方の足の腫れや痛み、急な胸の痛み
- 咳・息切れ・発熱が続く
- 歯ぐきの腫れ、あごの痛み(骨のお薬を使っている方)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 飲み薬は、飲む日と休む日を守りましょう(カレンダーへの記録が役立ちます)
- ホルモン療法は数年続けます。副作用が辛い時は、自己判断でやめずにご相談ください
- 下痢止めを渡されている場合は、使うタイミングを事前に確認しておきましょう
- 骨のお薬を使っている方は、歯科を受診する時に必ず伝えましょう
- 適度な運動と、カルシウム・ビタミンDをとる食事で骨を守りましょう
- 他の病院で出たお薬(抗うつ薬など)やサプリメントは、薬剤師にお知らせください