

大腸がんの抗がん剤治療を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

大腸がんの治療では、点滴と飲み薬を組み合わせることが多く、お薬によって出やすい症状や時期が違います。症状の多くは、早めに対処すれば軽くすむことができます。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 飲み薬と点滴のスケジュールの例

大腸がんでは「飲む日」と「休む日」が決まっているお薬がよく使われます。代表的な2つの例です。

CAPOX療法


3週間ごとにくり返す



1日目に点滴(オキサリプラチン)。カペシタビンは1日目の夕食後から14日間、朝・夕食後に飲み、その後7日間お休み

トリフルリジン・チピ ラシル

4週間ごとにくり返す



朝・夕食後に5日間飲んで2日休む、を2回くり返し、その後16日間お休み

■ 点滴・注射 ■ 飲み薬 ■ お休み 数字は治療開始からの日数

実際の飲み方はお薬によって違います。お渡しするカレンダーで確認し、休む日にも飲んでしまわないよう注意しましょう。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 水のような下痢が1日4回以上続く、下痢止めを飲んでも止まらない
- 食事や水分が1日以上とれない
- 便に血が混じる、強いおなかの痛みがある
- 手足の痛みや水ぶくれで歩けない、物が持てない
- 息苦しさ、じんましん、顔のむくみ(点滴中や点滴の後)

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 飲み薬は決められた日・時間に飲みます(多くは食後)。飲み忘れても、2回分を一度に飲まないでください
- オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、外出時は手袋を。冷蔵庫の物は手袋を使って取り出しましょう
- 保湿剤は1日2回以上、手足にたっぷり塗りましょう。きつい靴や長時間の歩行は避けます
- 携帯型ポンプを付けている間は、ポンプを濡らさず、管が折れたり引っ張られたりしないように気をつけます
- 市販の薬・サプリメント・健康食品を使う時は、事前に薬剤師にご相談ください
- 体温と排便の回数を、毎日メモしておくとう診時に役立ちます