

胃がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

胃がんの治療では、S-1などの飲み薬と点滴の抗がん剤、分子標的薬や免疫のお薬を組み合わせます。お薬によって出やすい症状や時期が違うため、気になることがあれば早めにご相談ください。

1 飲み薬と点滴のスケジュールの例

胃がんでよく使うS-1は、「飲む期間」と「休む期間」がはっきり決まっているお薬です。

S-1(手術後など)

6週間ごとにくり返す



朝・夕食後に4週間飲んで、2週間お休み

SOX療法

3週間ごとにくり返す



1日目に点滴(オキサリプラチン)。S-1は1日目の夕食後から2週間飲み、1週間お休み

■ 飲み薬 ■ お休み ■ 点滴・注射 数字は治療開始からの日数

他の病院で抗がん剤の飲み薬が出た時は、必ず薬剤師に伝えてください。S-1と一緒に飲むと危険な組み合わせがあります。

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 便が黒い、血を吐いた、強いおなかの痛み
- 食事や水分が1日以上とれない
- 咳・息切れ・発熱が続く
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 手足の痛みや水ぶくれで歩けない

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- S-1などの飲み薬は、飲む日と休む日を守りましょう。飲み忘れても2回分を一度に飲まないでください
- 他の病院で抗がん剤の飲み薬が出た時は、必ず薬剤師に伝えてください(一緒に飲むと危険な組み合わせがあります)
- 胃の手術を受けた方は、少ない量を回数を分けて食べましょう
- やわらかい歯ブラシとうがいで、口の中を清潔に保ちましょう
- オキサリプラチンの点滴後数日は、冷たい飲み物を避け、手袋を使いましょう
- 市販の薬・サプリメントを使う時は、事前にご相談ください