

肺がんの薬物療法を受ける方へ

治療中に気をつけたい症状と、毎日の過ごし方

肺がんの治療では、飲み薬(分子標的薬)、点滴の抗がん剤、免疫の働きを利用するお薬などが使われ、お薬によって出やすい症状が違います。気になることがあれば、病院や薬局にいつでもご相談ください。

1 肺がんのお薬で特に気をつけたい症状

咳・息切れ・発熱

肺の炎症(間質性肺炎)のサインのことがあります。どのお薬でも起こりうるため、すぐにご連絡を

下痢

飲み薬の分子標的薬で多い症状です。下痢止めの使い方を事前に確認しておきましょう

発疹・爪のまわりの腫れ

EGFRを標的とするお薬で出やすく、保湿と塗り薬で予防・治療します

だるさ・食欲低下

肝臓や甲状腺の副作用のこともあります。続く時はご相談を

むくみ・体重増加

一部のお薬で起こります。週に1~2回、体重を測りましょう

見え方の変化・ふらつき

お薬によっては起こることがあります。車の運転はご相談ください

2 こんな時はすぐにご連絡ください

- 咳・息切れ・発熱が続く、急に息苦しくなった
- 37.5℃以上の熱や寒気がある
- 水のような下痢が1日4回以上続く
- 動悸、めまい、脈が乱れる
- 皮膚や白目が黄色い、強いだるさがある
- 発疹が全身に広がる、水ぶくれができる

→ 次の受診日を待たずに、夜間・休日でも病院へ電話してください

3 毎日の生活で気をつけること

- 飲み薬は決められた時間に飲みましょう(空腹時・食後など、お薬ごとに違います)
- 飲み忘れても、2回分を一度に飲まないでください
- 市販の胃薬・サプリメント・グレープフルーツは、効き目が変わることがあるため事前にご相談ください
- 保湿とスキンケアを続け、爪は短く切りすぎないようにしましょう
- 禁煙を続けましょう(喫煙で効き目が弱まるお薬もあります)
- 咳や息切れの変化をメモしておき、受診時に伝えましょう